

表 1877 腎移植の回数 クレアチニン濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

クレアチニン 濃度	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	12 (100.0)					12 (100.0)		5	17
2～ (%)	124 (100.0)					124 (100.0)		30	154
4～ (%)	515 (99.6)	2 (0.4)				517 (100.0)		58	575
6～ (%)	1,002 (99.5)	5 (0.5)				1,007 (100.0)	2	124	1,133
8～ (%)	1,161 (98.9)	12 (1.0)	1 (0.1)			1,174 (100.0)	2	173	1,349
10～ (%)	958 (99.4)	6 (0.6)				964 (100.0)	2	149	1,115
12～ (%)	724 (98.2)	12 (1.6)	1 (0.1)			737 (100.0)	3	108	848
14～ (%)	428 (99.1)	4 (0.9)				432 (100.0)		56	488
16～ (%)	248 (98.0)	5 (2.0)				253 (100.0)	2	40	295
合計 (%)	5,172 (99.1)	46 (0.9)	2 (0.0)			5,220 (100.0)	11	743	5,974
記載なし (%)	603 (98.2)	10 (1.6)		1 (0.2)		614 (100.0)	12	2,341	2,967
総計 (%)	5,775 (99.0)	56 (1.0)	2 (0.0)	1 (0.0)		5,834 (100.0)	23	3,084	8,941
平均	9.87	11.43	10.75			9.88	11.89	9.89	9.89
標準偏差	3.53	3.34	2.90			3.53	3.94	3.53	3.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査