

表 1878 腎移植の回数 アルブミン濃度(g/dL)別 (腹膜透析患者)

アルブミン濃度	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	12 (100.0)					12 (100.0)		3	15
1.5～ (%)	58 (100.0)					58 (100.0)		13	71
2.0～ (%)	240 (98.8)	3 (1.2)				243 (100.0)		55	298
2.5～ (%)	891 (99.3)	6 (0.7)				897 (100.0)	1	139	1,037
3.0～ (%)	1,880 (98.9)	19 (1.0)	1 (0.1)			1,900 (100.0)	4	254	2,158
3.5～ (%)	1,665 (99.2)	13 (0.8)	1 (0.1)			1,679 (100.0)	2	225	1,906
4.0～ (%)	370 (98.4)	6 (1.6)				376 (100.0)	2	53	431
4.5～ (%)	20 (100.0)					20 (100.0)		1	21
5.0～ (%)	2 (100.0)					2 (100.0)			2
合計 (%)	5,138 (99.1)	47 (0.9)	2 (0.0)			5,187 (100.0)	9	743	5,939
記載なし (%)	637 (98.5)	9 (1.4)		1 (0.2)		647 (100.0)	14	2,341	3,002
総計 (%)	5,775 (99.0)	56 (1.0)	2 (0.0)	1 (0.0)		5,834 (100.0)	23	3,084	8,941
平均	3.28	3.31	3.60			3.28	3.43	3.23	3.28
標準偏差	0.51	0.50	0.28			0.51	0.51	0.55	0.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査