

表 1879 腎移植の回数 CRP濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

CRP濃度	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満	2,747	23	1			2,771	1	295	3,067
(%)	(99.1)	(0.8)	(0.0)			(100.0)			
0.2～	877	10				887	1	107	995
(%)	(98.9)	(1.1)				(100.0)			
0.5～	379	4				383	1	65	449
(%)	(99.0)	(1.0)				(100.0)			
1.0～	258	3				261		47	308
(%)	(98.9)	(1.1)				(100.0)			
2.0～	169	2				171	2	29	202
(%)	(98.8)	(1.2)				(100.0)			
4.0～	64	1				65		18	83
(%)	(98.5)	(1.5)				(100.0)			
6.0～	31	1				32		8	40
(%)	(96.9)	(3.1)				(100.0)			
8.0～	20					20		4	24
(%)	(100.0)					(100.0)			
10.0～	28					28		6	34
(%)	(100.0)					(100.0)			
15.0～	6					6		1	7
(%)	(100.0)					(100.0)			
合計	4,579	44	1			4,624	5	580	5,209
(%)	(99.0)	(1.0)	(0.0)			(100.0)			
記載なし	1,196	12	1	1		1,210	18	2,504	3,732
(%)	(98.8)	(1.0)	(0.1)	(0.1)		(100.0)			
総計	5,775	56	2	1		5,834	23	3,084	8,941
(%)	(99.0)	(1.0)	(0.0)	(0.0)		(100.0)			
平均	0.59	0.68	0.10			0.59	1.35	0.90	0.63
標準偏差	1.65	1.43				1.65	1.57	2.13	1.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査