

表 1880 腎移植の回数 補正カルシウム濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

補正 カルシウム濃度	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	23 (100.0)					23 (100.0)		6	29
7.0～ (%)	31 (100.0)					31 (100.0)	1	4	36
7.5～ (%)	103 (100.0)					103 (100.0)		24	127
8.0～ (%)	236 (97.9)	5 (2.1)				241 (100.0)		45	286
8.4～ (%)	73 (100.0)					73 (100.0)		13	86
8.5～ (%)	782 (99.4)	5 (0.6)				787 (100.0)	3	116	906
9.0～ (%)	1,375 (98.8)	16 (1.2)				1,391 (100.0)	4	207	1,602
9.5～ (%)	1,435 (99.3)	9 (0.6)	1 (0.1)			1,445 (100.0)	1	183	1,629
10.0～ (%)	167 (99.4)	1 (0.6)				168 (100.0)		23	191
10.1～ (%)	484 (98.6)	7 (1.4)				491 (100.0)		66	557
10.5～ (%)	259 (98.9)	3 (1.1)				262 (100.0)		34	296
11.0～ (%)	95 (99.0)	1 (1.0)				96 (100.0)		15	111
11.5～ (%)	28 (100.0)					28 (100.0)		1	29
12.0～ (%)	23 (95.8)		1 (4.2)			24 (100.0)		3	27
合計 (%)	5,114 (99.1)	47 (0.9)	2 (0.0)			5,163 (100.0)	9	740	5,912
記載なし (%)	661 (98.5)	9 (1.3)		1 (0.1)		671 (100.0)	14	2,344	3,029
総計 (%)	5,775 (99.0)	56 (1.0)	2 (0.0)	1 (0.0)		5,834 (100.0)	23	3,084	8,941
平均	9.42	9.43	11.05			9.42	8.87	9.33	9.41
標準偏差	0.79	0.71	1.91			0.79	0.69	0.81	0.80

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査