

表 1885 腎移植の回数 総コレステロール濃度(mg/dL)別(腹膜透析患者)

総コレステロール 濃度	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	42 (97.7)	1 (2.3)				43 (100.0)		7	50
100～ (%)	121 (97.6)	3 (2.4)				124 (100.0)	1	35	160
120～ (%)	391 (98.7)	5 (1.3)				396 (100.0)	1	51	448
140～ (%)	703 (99.2)	6 (0.8)				709 (100.0)	2	95	806
160～ (%)	755 (99.3)	5 (0.7)				760 (100.0)		105	865
180～ (%)	731 (99.2)	5 (0.7)	1 (0.1)			737 (100.0)		96	833
200～ (%)	472 (98.7)	6 (1.3)				478 (100.0)	3	83	564
220～ (%)	285 (99.3)	2 (0.7)				287 (100.0)		31	318
240～ (%)	140 (99.3)	1 (0.7)				141 (100.0)		18	159
260～ (%)	123 (98.4)	1 (0.8)	1 (0.8)			125 (100.0)		24	149
合計 (%)	3,763 (99.0)	35 (0.9)	2 (0.1)			3,800 (100.0)	7	545	4,352
記載なし (%)	2,012 (98.9)	21 (1.0)		1 (0.0)		2,034 (100.0)	16	2,539	4,589
総計 (%)	5,775 (99.0)	56 (1.0)	2 (0.0)	1 (0.0)		5,834 (100.0)	23	3,084	8,941
平均	179.23	170.91	295.00			179.21	165.86	177.79	179.01
標準偏差	40.14	42.05	137.18			40.30	42.33	42.15	40.54

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査