

表 1886 腎移植の回数 HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

| HDL-C濃度 | なし      | 1回    | 2回    | 3回    | 4回以上 | 合計      | 不明    | 記載なし  | 総計    |
|---------|---------|-------|-------|-------|------|---------|-------|-------|-------|
| 20未満    | 8       |       |       |       |      | 8       |       |       | 8     |
| (%)     | (100.0) |       |       |       |      | (100.0) |       |       |       |
| 20～     | 244     | 7     |       |       |      | 251     | 1     | 36    | 288   |
| (%)     | (97.2)  | (2.8) |       |       |      | (100.0) |       |       |       |
| 30～     | 804     | 6     |       |       |      | 810     |       | 123   | 933   |
| (%)     | (99.3)  | (0.7) |       |       |      | (100.0) |       |       |       |
| 40～     | 874     | 7     |       |       |      | 881     | 1     | 108   | 990   |
| (%)     | (99.2)  | (0.8) |       |       |      | (100.0) |       |       |       |
| 50～     | 738     | 6     | 1     |       |      | 745     | 2     | 92    | 839   |
| (%)     | (99.1)  | (0.8) | (0.1) |       |      | (100.0) |       |       |       |
| 60～     | 454     | 6     |       |       |      | 460     | 1     | 55    | 516   |
| (%)     | (98.7)  | (1.3) |       |       |      | (100.0) |       |       |       |
| 70～     | 229     | 1     |       |       |      | 230     |       | 29    | 259   |
| (%)     | (99.6)  | (0.4) |       |       |      | (100.0) |       |       |       |
| 80～     | 127     | 2     |       |       |      | 129     |       | 12    | 141   |
| (%)     | (98.4)  | (1.6) |       |       |      | (100.0) |       |       |       |
| 90～     | 56      |       |       |       |      | 56      |       | 5     | 61    |
| (%)     | (100.0) |       |       |       |      | (100.0) |       |       |       |
| 100～    | 51      | 2     |       |       |      | 53      | 1     | 3     | 57    |
| (%)     | (96.2)  | (3.8) |       |       |      | (100.0) |       |       |       |
| 合計      | 3,585   | 37    | 1     |       |      | 3,623   | 6     | 463   | 4,092 |
| (%)     | (99.0)  | (1.0) | (0.0) |       |      | (100.0) |       |       |       |
| 記載なし    | 2,190   | 19    | 1     | 1     |      | 2,211   | 17    | 2,621 | 4,849 |
| (%)     | (99.1)  | (0.9) | (0.0) | (0.0) |      | (100.0) |       |       |       |
| 総計      | 5,775   | 56    | 2     | 1     |      | 5,834   | 23    | 3,084 | 8,941 |
| (%)     | (99.0)  | (1.0) | (0.0) | (0.0) |      | (100.0) |       |       |       |
| 平均      | 50.65   | 49.35 | 59.00 |       |      | 50.64   | 63.17 | 48.97 | 50.47 |
| 標準偏差    | 17.74   | 20.82 |       |       |      | 17.77   | 37.31 | 16.87 | 17.72 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査