

表 1887 腎移植の回数 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

Non-HDL-C濃度	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
50未満	17					17		1	18
(%)	(100.0)					(100.0)			
50～	99	1				100		14	114
(%)	(99.0)	(1.0)				(100.0)			
70～	292	4				296	3	52	351
(%)	(98.6)	(1.4)				(100.0)			
90～	597	6				603	1	56	660
(%)	(99.0)	(1.0)				(100.0)			
110～	712	5				717		80	797
(%)	(99.3)	(0.7)				(100.0)			
130～	589	9				598		64	662
(%)	(98.5)	(1.5)				(100.0)			
150～	382	3				385	1	50	436
(%)	(99.2)	(0.8)				(100.0)			
170～	222	2				224	1	38	263
(%)	(99.1)	(0.9)				(100.0)			
190～	111					111		9	120
(%)	(100.0)					(100.0)			
210～	74		1			75		15	90
(%)	(98.7)		(1.3)			(100.0)			
合計	3,095	30	1			3,126	6	379	3,511
(%)	(99.0)	(1.0)	(0.0)			(100.0)			
記載なし	2,680	26	1	1		2,708	17	2,705	5,430
(%)	(99.0)	(1.0)	(0.0)	(0.0)		(100.0)			
総計	5,775	56	2	1		5,834	23	3,084	8,941
(%)	(99.0)	(1.0)	(0.0)	(0.0)		(100.0)			
平均	128.29	122.87	333.00			128.30	112.50	130.09	128.47
標準偏差	37.56	30.62				37.67	42.08	40.71	38.01

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査