

表 1888 腎移植の回数 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

収縮期血圧	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)								1	1
60～ (%)	12 (100.0)					12 (100.0)		1	13
80～ (%)	98 (96.1)	4 (3.9)				102 (100.0)		22	124
100～ (%)	577 (99.1)	5 (0.9)				582 (100.0)	2	57	641
120～ (%)	1,341 (98.7)	16 (1.2)	1 (0.1)			1,358 (100.0)	4	154	1,516
140～ (%)	1,410 (99.3)	10 (0.7)				1,420 (100.0)	1	158	1,579
160～ (%)	621 (99.4)	4 (0.6)				625 (100.0)		96	721
180～ (%)	188 (99.5)	1 (0.5)				189 (100.0)		28	217
200～ (%)	29 (100.0)					29 (100.0)		2	31
220～ (%)	9 (100.0)					9 (100.0)		1	10
合計 (%)	4,285 (99.1)	40 (0.9)	1 (0.0)			4,326 (100.0)	7	520	4,853
記載なし (%)	1,490 (98.8)	16 (1.1)	1 (0.1)	1 (0.1)		1,508 (100.0)	16	2,564	4,088
総計 (%)	5,775 (99.0)	56 (1.0)	2 (0.0)	1 (0.0)		5,834 (100.0)	23	3,084	8,941
平均	140.89	133.07	120.00			140.81	124.71	142.86	141.01
標準偏差	22.66	22.16				22.67	13.74	24.53	22.88

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査