

表 1891 透析時間(時間/回) 性別(施設血液透析患者 透析回数週3回)

性別	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	280	14,342	10,591	100,309	8,212	10,975	401	706	38	368	146,222	811	147,033	4.00	0.52
(%)	(0.2)	(9.8)	(7.2)	(68.6)	(5.6)	(7.5)	(0.3)	(0.5)	(0.0)	(0.3)	(100.0)				
女性	241	10,478	7,348	54,689	3,466	4,612	194	288	20	143	81,479	459	81,938	3.93	0.52
(%)	(0.3)	(12.9)	(9.0)	(67.1)	(4.3)	(5.7)	(0.2)	(0.4)	(0.0)	(0.2)	(100.0)				
合計	521	24,820	17,939	154,998	11,678	15,587	595	994	58	511	227,701	1,270	228,971	3.97	0.52
(%)	(0.2)	(10.9)	(7.9)	(68.1)	(5.1)	(6.8)	(0.3)	(0.4)	(0.0)	(0.2)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	521	24,820	17,939	154,998	11,678	15,587	595	994	58	511	227,701	1,270	228,971	3.97	0.52
(%)	(0.2)	(10.9)	(7.9)	(68.1)	(5.1)	(6.8)	(0.3)	(0.4)	(0.0)	(0.2)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査