

表 1906 透析時間(時間/回) nPCR(g/kg/day)別(施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	8 (2.2)	82 (22.2)	32 (8.7)	226 (61.2)	10 (2.7)	10 (2.7)		1 (0.3)			369 (100.0)		369	3.75	0.54
0.4～ (%)	49 (0.6)	1,503 (17.9)	803 (9.5)	5,485 (65.2)	227 (2.7)	301 (3.6)	13 (0.2)	24 (0.3)	1 (0.0)	12 (0.1)	8,418 (100.0)		8,418	3.83	0.52
0.6～ (%)	100 (0.2)	4,871 (9.6)	4,503 (8.8)	35,659 (70.0)	2,372 (4.7)	3,071 (6.0)	85 (0.2)	192 (0.4)	12 (0.0)	91 (0.2)	50,956 (100.0)		50,956	3.97	0.49
0.8～ (%)	73 (0.1)	3,967 (5.6)	5,003 (7.1)	50,274 (71.3)	4,515 (6.4)	5,869 (8.3)	244 (0.3)	371 (0.5)	20 (0.0)	175 (0.2)	70,511 (100.0)		70,511	4.06	0.49
1.0～ (%)	25 (0.1)	1,116 (4.0)	1,604 (5.7)	19,771 (70.0)	2,236 (7.9)	3,029 (10.7)	132 (0.5)	199 (0.7)	11 (0.0)	125 (0.4)	28,248 (100.0)		28,248	4.13	0.52
1.2～ (%)	4 (0.1)	155 (3.2)	242 (4.9)	3,327 (67.7)	449 (9.1)	650 (13.2)	20 (0.4)	34 (0.7)	6 (0.1)	29 (0.6)	4,916 (100.0)		4,916	4.18	0.55
1.4～ (%)	1 (0.2)	17 (3.1)	19 (3.4)	363 (65.4)	45 (8.1)	91 (16.4)	3 (0.5)	11 (2.0)	1 (0.2)	4 (0.7)	555 (100.0)		555	4.24	0.62
1.6～ (%)		8 (10.1)	4 (5.1)	46 (58.2)	9 (11.4)	10 (12.7)		2 (2.5)			79 (100.0)		79	4.12	0.60
1.8～ (%)	1 (4.0)	3 (12.0)		18 (72.0)	1 (4.0)	2 (8.0)					25 (100.0)		25	3.86	0.75
2.0～ (%)		5 (13.2)	3 (7.9)	23 (60.5)	3 (7.9)	4 (10.5)					38 (100.0)		38	3.97	0.53
合計 (%)	261 (0.2)	11,727 (7.1)	12,213 (7.4)	115,192 (70.2)	9,867 (6.0)	13,037 (7.9)	497 (0.3)	834 (0.5)	51 (0.0)	436 (0.3)	164,115 (100.0)		164,115	4.03	0.51
記載なし (%)	34 (0.3)	1,438 (11.0)	954 (7.3)	9,192 (70.3)	588 (4.5)	749 (5.7)	59 (0.5)	41 (0.3)	3 (0.0)	9 (0.1)	13,067 (100.0)	1,027	14,094	3.96	0.49
総計 (%)	295 (0.2)	13,165 (7.4)	13,167 (7.4)	124,384 (70.2)	10,455 (5.9)	13,786 (7.8)	556 (0.3)	875 (0.5)	54 (0.0)	445 (0.3)	177,182 (100.0)	1,027	178,209	4.03	0.50
平均	0.76	0.78	0.83	0.86	0.91	0.91	0.93	0.91	0.94	0.94	0.86		0.86		
標準偏差	0.22	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18	0.20	0.18	0.18		0.18		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査