

表 1908 透析時間(時間/回) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別(施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前アルブミン 濃度	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)	1 (0.7)	44 (30.3)	7 (4.8)	86 (59.3)	3 (2.1)	4 (2.8)					145 (100.0)	1	146	3.70	0.54
1.5～ (%)	5 (0.7)	260 (33.9)	58 (7.6)	418 (54.5)	11 (1.4)	13 (1.7)		2 (0.3)			767 (100.0)	4	771	3.65	0.54
2.0～ (%)	37 (1.2)	834 (26.4)	265 (8.4)	1,867 (59.1)	57 (1.8)	88 (2.8)	4 (0.1)	6 (0.2)		3 (0.1)	3,161 (100.0)	18	3,179	3.73	0.55
2.5～ (%)	79 (0.7)	2,435 (20.1)	1,076 (8.9)	7,701 (63.6)	347 (2.9)	431 (3.6)	11 (0.1)	23 (0.2)	1 (0.0)	7 (0.1)	12,111 (100.0)	39	12,150	3.81	0.51
3.0～ (%)	131 (0.3)	6,403 (12.3)	4,355 (8.4)	35,323 (68.0)	2,329 (4.5)	2,999 (5.8)	108 (0.2)	174 (0.3)	19 (0.0)	107 (0.2)	51,948 (100.0)	134	52,082	3.94	0.52
3.5～ (%)	173 (0.2)	9,691 (9.1)	8,198 (7.7)	73,592 (68.9)	5,971 (5.6)	8,080 (7.6)	323 (0.3)	502 (0.5)	29 (0.0)	268 (0.3)	106,827 (100.0)	308	107,135	4.01	0.52
4.0～ (%)	71 (0.2)	3,410 (8.4)	2,998 (7.4)	27,638 (68.5)	2,393 (5.9)	3,338 (8.3)	131 (0.3)	259 (0.6)	9 (0.0)	115 (0.3)	40,362 (100.0)	144	40,506	4.03	0.53
4.5～ (%)	4 (0.2)	197 (8.4)	170 (7.2)	1,613 (68.4)	139 (5.9)	199 (8.4)	8 (0.3)	20 (0.8)		7 (0.3)	2,357 (100.0)	5	2,362	4.04	0.54
5.0～ (%)		28 (16.4)	12 (7.0)	111 (64.9)	10 (5.8)	10 (5.8)					171 (100.0)	1	172	3.90	0.50
合計 (%)	501 (0.2)	23,302 (10.7)	17,139 (7.9)	148,349 (68.1)	11,260 (5.2)	15,162 (7.0)	585 (0.3)	986 (0.5)	58 (0.0)	507 (0.2)	217,849 (100.0)	654	218,503	3.98	0.52
記載なし (%)	20 (0.2)	1,518 (15.4)	800 (8.1)	6,649 (67.5)	418 (4.2)	425 (4.3)	10 (0.1)	8 (0.1)		4 (0.0)	9,852 (100.0)	616	10,468	3.88	0.48
総計 (%)	521 (0.2)	24,820 (10.9)	17,939 (7.9)	154,998 (68.1)	11,678 (5.1)	15,587 (6.8)	595 (0.3)	994 (0.4)	58 (0.0)	511 (0.2)	227,701 (100.0)	1,270	228,971	3.97	0.52
平均	3.36	3.46	3.58	3.61	3.68	3.68	3.71	3.72	3.61	3.70	3.60	3.59	3.60		
標準偏差	0.59	0.53	0.45	0.43	0.38	0.38	0.36	0.39	0.31	0.37	0.44	0.49	0.44		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査