

表 1910 透析時間(時間/回) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別(施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前補正 カルシウム濃度	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)	5 (0.6)	133 (15.3)	74 (8.5)	546 (62.6)	45 (5.2)	66 (7.6)	1 (0.1)	2 (0.2)			872 (100.0)	2	874	3.91	0.53
7.0～ (%)	6 (0.5)	194 (15.3)	99 (7.8)	821 (65.0)	43 (3.4)	92 (7.3)	2 (0.2)	3 (0.2)	2 (0.2)	2 (0.2)	1,264 (100.0)	2	1,266	3.91	0.55
7.5～ (%)	9 (0.2)	672 (13.6)	385 (7.8)	3,277 (66.1)	238 (4.8)	331 (6.7)	8 (0.2)	27 (0.5)		8 (0.2)	4,955 (100.0)	16	4,971	3.94	0.53
8.0～ (%)	39 (0.2)	2,010 (12.4)	1,349 (8.3)	10,964 (67.5)	740 (4.6)	986 (6.1)	32 (0.2)	88 (0.5)	2 (0.0)	28 (0.2)	16,238 (100.0)	52	16,290	3.94	0.52
8.4～ (%)	10 (0.2)	594 (12.7)	354 (7.6)	3,166 (68.0)	208 (4.5)	287 (6.2)	13 (0.3)	18 (0.4)		9 (0.2)	4,659 (100.0)	17	4,676	3.94	0.52
8.5～ (%)	127 (0.2)	6,207 (11.6)	4,508 (8.4)	36,215 (67.4)	2,601 (4.8)	3,554 (6.6)	124 (0.2)	251 (0.5)	14 (0.0)	128 (0.2)	53,729 (100.0)	173	53,902	3.96	0.53
9.0～ (%)	140 (0.2)	6,566 (10.1)	5,150 (7.9)	44,292 (68.1)	3,461 (5.3)	4,749 (7.3)	194 (0.3)	316 (0.5)	20 (0.0)	177 (0.3)	65,065 (100.0)	171	65,236	3.99	0.53
9.5～ (%)	85 (0.2)	3,908 (9.2)	3,132 (7.4)	29,176 (69.0)	2,406 (5.7)	3,124 (7.4)	137 (0.3)	180 (0.4)	13 (0.0)	106 (0.3)	42,267 (100.0)	137	42,404	4.00	0.52
10.0～ (%)	15 (0.3)	524 (10.0)	344 (6.6)	3,581 (68.7)	316 (6.1)	379 (7.3)	17 (0.3)	26 (0.5)	2 (0.0)	12 (0.2)	5,216 (100.0)	11	5,227	4.00	0.53
10.1～ (%)	34 (0.3)	1,233 (9.3)	1,023 (7.7)	9,167 (69.2)	702 (5.3)	969 (7.3)	38 (0.3)	45 (0.3)	5 (0.0)	24 (0.2)	13,240 (100.0)	37	13,277	3.99	0.50
10.5～ (%)	14 (0.2)	683 (10.6)	443 (6.9)	4,456 (69.3)	347 (5.4)	448 (7.0)	9 (0.1)	22 (0.3)		8 (0.1)	6,430 (100.0)	23	6,453	3.98	0.50
11.0～ (%)	7 (0.3)	261 (12.1)	168 (7.8)	1,490 (69.1)	110 (5.1)	105 (4.9)	9 (0.4)	5 (0.2)		1 (0.0)	2,156 (100.0)	9	2,165	3.93	0.48
11.5～ (%)	4 (0.5)	120 (15.6)	49 (6.4)	535 (69.7)	24 (3.1)	34 (4.4)	1 (0.1)			1 (0.1)	768 (100.0)	1	769	3.88	0.49
12.0～ (%)	2 (0.4)	111 (20.6)	38 (7.1)	346 (64.3)	15 (2.8)	24 (4.5)		1 (0.2)		1 (0.2)	538 (100.0)	1	539	3.83	0.53
合計 (%)	497 (0.2)	23,216 (10.7)	17,116 (7.9)	148,032 (68.1)	11,256 (5.2)	15,148 (7.0)	585 (0.3)	984 (0.5)	58 (0.0)	505 (0.2)	217,397 (100.0)	652	218,049	3.98	0.52
記載なし (%)	24 (0.2)	1,604 (15.6)	823 (8.0)	6,966 (67.6)	422 (4.1)	439 (4.3)	10 (0.1)	10 (0.1)		6 (0.1)	10,304 (100.0)	618	10,922	3.88	0.48
総計 (%)	521 (0.2)	24,820 (10.9)	17,939 (7.9)	154,998 (68.1)	11,678 (5.1)	15,587 (6.8)	595 (0.3)	994 (0.4)	58 (0.0)	511 (0.2)	227,701 (100.0)	1,270	228,971	3.97	0.52
平均	9.17	9.13	9.15	9.19	9.22	9.20	9.25	9.12	9.19	9.19	9.18	9.18	9.18		
標準偏差	0.85	0.79	0.74	0.74	0.71	0.72	0.68	0.66	0.65	0.61	0.74	0.73	0.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査