

表 1912 透析時間(時間/回) PTH値(pg/mL)別(施設血液透析患者 透析回数週3回) PTH測定法:intact-PTH

PTH値	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	37 (0.4)	1,203 (12.7)	773 (8.2)	6,390 (67.4)	468 (4.9)	542 (5.7)	22 (0.2)	36 (0.4)	1 (0.0)	11 (0.1)	9,483 (100.0)	29	9,512	3.93	0.51
20～ (%)	26 (0.2)	1,726 (12.6)	1,186 (8.7)	9,225 (67.3)	597 (4.4)	837 (6.1)	48 (0.4)	44 (0.3)	2 (0.0)	13 (0.1)	13,704 (100.0)	25	13,729	3.94	0.51
40～ (%)	32 (0.2)	1,629 (11.2)	1,197 (8.3)	10,001 (69.0)	690 (4.8)	836 (5.8)	37 (0.3)	47 (0.3)	1 (0.0)	19 (0.1)	14,489 (100.0)	36	14,525	3.95	0.49
60～ (%)	32 (0.2)	1,650 (10.7)	1,315 (8.5)	10,657 (68.9)	750 (4.8)	933 (6.0)	39 (0.3)	51 (0.3)	2 (0.0)	43 (0.3)	15,472 (100.0)	42	15,514	3.96	0.52
80～ (%)	24 (0.2)	1,674 (10.7)	1,240 (7.9)	10,911 (69.8)	784 (5.0)	893 (5.7)	38 (0.2)	50 (0.3)	1 (0.0)	24 (0.2)	15,639 (100.0)	32	15,671	3.96	0.49
100～ (%)	29 (0.2)	1,575 (10.3)	1,362 (8.9)	10,485 (68.8)	746 (4.9)	916 (6.0)	42 (0.3)	53 (0.3)	2 (0.0)	29 (0.2)	15,239 (100.0)	32	15,271	3.96	0.50
120～ (%)	24 (0.2)	1,522 (10.5)	1,142 (7.8)	10,161 (69.8)	709 (4.9)	875 (6.0)	38 (0.3)	70 (0.5)		22 (0.2)	14,563 (100.0)	23	14,586	3.97	0.50
140～ (%)	21 (0.2)	1,353 (10.0)	1,082 (8.0)	9,394 (69.7)	701 (5.2)	813 (6.0)	37 (0.3)	44 (0.3)	1 (0.0)	24 (0.2)	13,470 (100.0)	33	13,503	3.97	0.49
160～ (%)	25 (0.2)	1,178 (9.7)	948 (7.8)	8,422 (69.7)	663 (5.5)	740 (6.1)	38 (0.3)	43 (0.4)	6 (0.0)	21 (0.2)	12,084 (100.0)	23	12,107	3.98	0.50
180～ (%)	54 (0.2)	2,663 (9.7)	2,206 (8.1)	19,131 (69.9)	1,418 (5.2)	1,689 (6.2)	64 (0.2)	89 (0.3)	6 (0.0)	65 (0.2)	27,385 (100.0)	43	27,428	3.98	0.50
240～ (%)	2 (0.6)	30 (8.9)	25 (7.4)	242 (71.8)	14 (4.2)	22 (6.5)		1 (0.3)		1 (0.3)	337 (100.0)	1	338	3.97	0.51
241～ (%)	32 (0.2)	1,466 (9.4)	1,135 (7.3)	10,945 (70.3)	892 (5.7)	961 (6.2)	30 (0.2)	49 (0.3)	5 (0.0)	53 (0.3)	15,568 (100.0)	30	15,598	3.99	0.51
300～ (%)	16 (0.2)	861 (9.6)	627 (7.0)	6,326 (70.5)	503 (5.6)	561 (6.3)	20 (0.2)	28 (0.3)	2 (0.0)	27 (0.3)	8,971 (100.0)	21	8,992	3.99	0.50
360～ (%)	13 (0.3)	526 (10.3)	389 (7.6)	3,536 (69.2)	266 (5.2)	335 (6.6)	9 (0.2)	20 (0.4)	4 (0.1)	15 (0.3)	5,113 (100.0)	11	5,124	3.98	0.53
420～ (%)	8 (0.3)	284 (9.4)	239 (7.9)	2,087 (69.2)	164 (5.4)	216 (7.2)	4 (0.1)	8 (0.3)	1 (0.0)	6 (0.2)	3,017 (100.0)	7	3,024	3.99	0.50
480～ (%)	3 (0.4)	89 (12.1)	42 (5.7)	497 (67.8)	43 (5.9)	52 (7.1)	2 (0.3)	3 (0.4)		2 (0.3)	733 (100.0)	3	736	3.98	0.55
500～ (%)	5 (0.4)	116 (9.8)	87 (7.3)	813 (68.5)	67 (5.6)	85 (7.2)	4 (0.3)	2 (0.2)		8 (0.7)	1,187 (100.0)	2	1,189	4.00	0.57
540～ (%)	6 (0.5)	142 (10.9)	97 (7.4)	881 (67.4)	67 (5.1)	96 (7.3)	4 (0.3)	8 (0.6)	1 (0.1)	5 (0.4)	1,307 (100.0)	3	1,310	3.99	0.56
600～ (%)	8 (0.4)	219 (10.3)	131 (6.2)	1,460 (68.7)	115 (5.4)	172 (8.1)	8 (0.4)	6 (0.3)		6 (0.3)	2,125 (100.0)	7	2,132	4.00	0.54
800～ (%)	3 (0.2)	128 (7.9)	88 (5.4)	1,125 (69.5)	104 (6.4)	152 (9.4)	2 (0.1)	10 (0.6)	2 (0.1)	4 (0.2)	1,618 (100.0)	4	1,622	4.05	0.53
合計 (%)	400 (0.2)	20,034 (10.5)	15,311 (8.0)	132,689 (69.3)	9,761 (5.1)	11,726 (6.1)	486 (0.3)	662 (0.3)	37 (0.0)	398 (0.2)	191,504 (100.0)	407	191,911	3.97	0.50
記載なし (%)	23 (0.5)	766 (16.9)	349 (7.7)	3,048 (67.4)	161 (3.6)	162 (3.6)	5 (0.1)	6 (0.1)		5 (0.1)	4,525 (100.0)	150	4,675	3.87	0.50
総計 (0.2)	423 (10.6)	20,800 (10.6)	15,660 (8.0)	135,737 (69.2)	9,922 (5.1)	11,888 (6.1)	491 (0.3)	668 (0.3)	37 (0.0)	403 (0.2)	196,029 (100.0)	557	196,586	3.97	0.50
平均	178.36	160.57	161.23	170.65	179.42	180.08	159.67	174.74	264.92	207.09	169.97	171.81	169.97		
標準偏差	167.80	148.14	147.82	161.07	182.66	173.86	144.21	175.18	253.16	172.48	160.91	187.23	160.97		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査