

表 1921 透析時間(時間/回) 性別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

性別	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	51	1,276	1,408	16,595	2,607	2,721	157	201	8	28	25,052	142	25,194	4.12	0.50
(%)	(0.2)	(5.1)	(5.6)	(66.2)	(10.4)	(10.9)	(0.6)	(0.8)	(0.0)	(0.1)	(100.0)				
女性	41	1,006	1,071	9,839	1,241	1,311	61	83	9	8	14,670	82	14,752	4.06	0.49
(%)	(0.3)	(6.9)	(7.3)	(67.1)	(8.5)	(8.9)	(0.4)	(0.6)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
合計	92	2,282	2,479	26,434	3,848	4,032	218	284	17	36	39,722	224	39,946	4.10	0.50
(%)	(0.2)	(5.7)	(6.2)	(66.5)	(9.7)	(10.2)	(0.5)	(0.7)	(0.0)	(0.1)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	92	2,282	2,479	26,434	3,848	4,032	218	284	17	36	39,722	224	39,946	4.10	0.50
(%)	(0.2)	(5.7)	(6.2)	(66.5)	(9.7)	(10.2)	(0.5)	(0.7)	(0.0)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査