

表 1924 透析時間(時間/回) 原疾患別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

原疾患	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	38 (0.3)	588 (3.9)	741 (4.9)	9,665 (64.5)	1,797 (12.0)	1,869 (12.5)	123 (0.8)	139 (0.9)	12 (0.1)	19 (0.1)	14,991 (100.0)	85	15,076	4.17	0.51
慢性腎盂腎炎 (%)	1 (0.2)	10 (2.4)	25 (6.0)	286 (68.3)	37 (8.8)	52 (12.4)	2 (0.5)	5 (1.2)	1 (0.2)		419 (100.0)	3	422	4.16	0.50
急速進行性糸球 体腎炎 (%)		13 (4.6)	23 (8.1)	195 (68.7)	27 (9.5)	23 (8.1)	1 (0.4)	2 (0.7)			284 (100.0)		284	4.08	0.45
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)		11 (3.1)	20 (5.6)	235 (65.6)	48 (13.4)	43 (12.0)		1 (0.3)			358 (100.0)	1	359	4.15	0.44
その他の分類不 能の腎炎 (%)	1 (0.5)	6 (3.1)	4 (2.1)	123 (63.4)	31 (16.0)	23 (11.9)	2 (1.0)	4 (2.1)			194 (100.0)	1	195	4.22	0.51
多発性嚢胞腎 (%)	3 (0.2)	84 (5.8)	81 (5.6)	994 (68.6)	143 (9.9)	127 (8.8)	8 (0.6)	9 (0.6)	1 (0.1)		1,450 (100.0)	14	1,464	4.08	0.48
腎硬化症 (%)	9 (0.3)	253 (8.8)	256 (8.9)	1,949 (68.0)	191 (6.7)	190 (6.6)	9 (0.3)	9 (0.3)		2 (0.1)	2,868 (100.0)	18	2,886	3.99	0.48
悪性高血圧 (%)		18 (5.8)	26 (8.4)	193 (62.3)	30 (9.7)	41 (13.2)		2 (0.6)			310 (100.0)	2	312	4.10	0.50
糖尿病性腎症 (%)	31 (0.2)	898 (6.9)	909 (6.9)	8,963 (68.4)	1,044 (8.0)	1,131 (8.6)	40 (0.3)	70 (0.5)	2 (0.0)	8 (0.1)	13,096 (100.0)	77	13,173	4.05	0.48
SLE腎炎 (%)		19 (5.3)	36 (10.0)	223 (62.1)	28 (7.8)	41 (11.4)	4 (1.1)	7 (1.9)	1 (0.3)		359 (100.0)	4	363	4.13	0.56
アミロイド腎 (%)		7 (11.9)	4 (6.8)	39 (66.1)	7 (11.9)	2 (3.4)					59 (100.0)		59	3.96	0.45
痛風腎 (%)		7 (4.6)	11 (7.3)	101 (66.9)	16 (10.6)	14 (9.3)		1 (0.7)		1 (0.7)	151 (100.0)	3	154	4.11	0.55
先天性代謝異常 による腎不全 (%)		1 (2.3)	2 (4.5)	26 (59.1)	6 (13.6)	9 (20.5)					44 (100.0)		44	4.23	0.47
腎・尿路結核 (%)		1 (4.5)	3 (13.6)	12 (54.5)	4 (18.2)	2 (9.1)					22 (100.0)		22	4.07	0.47
腎・尿路結石 (%)		5 (7.4)	5 (7.4)	48 (70.6)	4 (5.9)	6 (8.8)					68 (100.0)	1	69	4.03	0.45
腎・尿路腫瘍 (%)		10 (11.8)	6 (7.1)	47 (55.3)	6 (7.1)	15 (17.6)	1 (1.2)				85 (100.0)		85	4.09	0.60
閉塞性尿路障害 (%)		3 (4.1)	9 (12.2)	47 (63.5)	5 (6.8)	10 (13.5)					74 (100.0)		74	4.09	0.46
骨髄腫 (%)		2 (10.5)	2 (10.5)	15 (78.9)							19 (100.0)		19	3.87	0.33
腎形成不全 (%)		3 (3.0)	5 (5.0)	67 (66.3)	13 (12.9)	11 (10.9)	2 (2.0)				101 (100.0)		101	4.16	0.46
不明 (%)	9 (0.3)	281 (8.1)	245 (7.1)	2,330 (67.2)	292 (8.4)	268 (7.7)	18 (0.5)	21 (0.6)		5 (0.1)	3,469 (100.0)	11	3,480	4.04	0.51
再導入 (%)		11 (2.7)	12 (2.9)	271 (65.5)	40 (9.7)	65 (15.7)	4 (1.0)	10 (2.4)		1 (0.2)	414 (100.0)	2	416	4.25	0.55
その他 (%)		51 (5.7)	54 (6.1)	605 (68.2)	79 (8.9)	90 (10.1)	4 (0.5)	4 (0.5)			887 (100.0)	2	889	4.09	0.47
合計 (%)	92 (0.2)	2,282 (5.7)	2,479 (6.2)	26,434 (66.5)	3,848 (9.7)	4,032 (10.2)	218 (0.5)	284 (0.7)	17 (0.0)	36 (0.1)	39,722 (100.0)	224	39,946	4.10	0.50
記載なし (%)															
総計 (%)	92 (0.2)	2,282 (5.7)	2,479 (6.2)	26,434 (66.5)	3,848 (9.7)	4,032 (10.2)	218 (0.5)	284 (0.7)	17 (0.0)	36 (0.1)	39,722 (100.0)	224	39,946	4.10	0.50

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査