

表 1928 透析時間(時間/回) 透析後体重(kg)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析後体重	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)			1 (8.3)	8 (66.7)		3 (25.0)					12 (100.0)		12	4.21	0.50
20～ (%)		21 (27.6)	11 (14.5)	40 (52.6)	2 (2.6)	1 (1.3)	1 (1.3)				76 (100.0)		76	3.72	0.51
30～ (%)	11 (0.4)	320 (11.9)	274 (10.2)	1,747 (65.2)	157 (5.9)	157 (5.9)	6 (0.2)	7 (0.3)		1 (0.0)	2,680 (100.0)	2	2,682	3.93	0.49
40～ (%)	30 (0.3)	749 (7.5)	755 (7.6)	6,766 (67.7)	806 (8.1)	797 (8.0)	40 (0.4)	41 (0.4)	4 (0.0)	6 (0.1)	9,994 (100.0)	11	10,005	4.04	0.49
50～ (%)	34 (0.3)	696 (5.6)	822 (6.6)	8,479 (68.0)	1,161 (9.3)	1,132 (9.1)	55 (0.4)	81 (0.6)	5 (0.0)	8 (0.1)	12,473 (100.0)	17	12,490	4.08	0.48
60～ (%)	10 (0.1)	324 (3.9)	391 (4.7)	5,620 (67.2)	926 (11.1)	949 (11.4)	52 (0.6)	72 (0.9)	3 (0.0)	10 (0.1)	8,357 (100.0)	8	8,365	4.15	0.49
70～ (%)	5 (0.1)	83 (2.4)	131 (3.8)	2,186 (63.9)	450 (13.2)	485 (14.2)	37 (1.1)	35 (1.0)	3 (0.1)	5 (0.1)	3,420 (100.0)	3	3,423	4.22	0.51
80～ (%)	1 (0.1)	28 (2.2)	32 (2.5)	719 (56.6)	175 (13.8)	271 (21.3)	15 (1.2)	26 (2.0)		4 (0.3)	1,271 (100.0)	2	1,273	4.33	0.57
90～ (%)		4 (0.9)	12 (2.6)	218 (47.9)	81 (17.8)	115 (25.3)	10 (2.2)	12 (2.6)	2 (0.4)	1 (0.2)	455 (100.0)		455	4.44	0.58
100～ (%)				68 (47.9)	26 (18.3)	43 (30.3)	2 (1.4)	2 (1.4)		1 (0.7)	142 (100.0)		142	4.49	0.59
110～ (%)	1 (1.6)	2 (3.3)	1 (1.6)	23 (37.7)	5 (8.2)	26 (42.6)		3 (4.9)			61 (100.0)		61	4.52	0.68
120～ (%)				10 (27.0)	5 (13.5)	18 (48.6)		4 (10.8)			37 (100.0)		37	4.77	0.61
合計 (%)	92 (0.2)	2,227 (5.7)	2,430 (6.2)	25,884 (66.4)	3,794 (9.7)	3,997 (10.3)	218 (0.6)	283 (0.7)	17 (0.0)	36 (0.1)	38,978 (100.0)	43	39,021	4.10	0.50
記載なし (%)		55 (7.4)	49 (6.6)	550 (73.9)	54 (7.3)	35 (4.7)		1 (0.1)			744 (100.0)	181	925	3.98	0.40
総計 (%)	92 (0.2)	2,282 (5.7)	2,479 (6.2)	26,434 (66.5)	3,848 (9.7)	4,032 (10.2)	218 (0.5)	284 (0.7)	17 (0.0)	36 (0.1)	39,722 (100.0)	224	39,946	4.10	0.50
平均	52.28	51.17	52.73	56.16	59.50	61.46	62.51	64.60	61.36	64.54	56.63	55.60	56.63		
標準偏差	12.43	11.15	11.20	12.33	13.74	15.59	14.83	16.71	16.21	15.58	13.03	11.77	13.03		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査