

表 1936 透析時間(時間/回) nPCR(g/kg/day)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	1 (2.3)	9 (20.9)	4 (9.3)	25 (58.1)	2 (4.7)	2 (4.7)					43 (100.0)		43	3.78	0.58
0.4～ (%)	4 (0.4)	122 (10.8)	101 (8.9)	768 (68.0)	64 (5.7)	62 (5.5)	6 (0.5)	3 (0.3)			1,130 (100.0)		1,130	3.95	0.48
0.6～ (%)	23 (0.3)	514 (5.7)	594 (6.5)	6,304 (69.5)	737 (8.1)	793 (8.7)	44 (0.5)	51 (0.6)	3 (0.0)	10 (0.1)	9,073 (100.0)		9,073	4.07	0.48
0.8～ (%)	17 (0.1)	481 (3.2)	811 (5.5)	9,994 (67.2)	1,674 (11.3)	1,682 (11.3)	89 (0.6)	115 (0.8)	2 (0.0)	15 (0.1)	14,880 (100.0)		14,880	4.15	0.48
1.0～ (%)	10 (0.2)	145 (2.2)	315 (4.8)	4,170 (63.8)	842 (12.9)	914 (14.0)	53 (0.8)	74 (1.1)	2 (0.0)	6 (0.1)	6,531 (100.0)		6,531	4.21	0.50
1.2～ (%)		18 (1.5)	43 (3.7)	674 (57.8)	177 (15.2)	216 (18.5)	15 (1.3)	16 (1.4)	6 (0.5)	2 (0.2)	1,167 (100.0)		1,167	4.31	0.55
1.4～ (%)		5 (3.9)	3 (2.3)	68 (53.1)	16 (12.5)	31 (24.2)	1 (0.8)	4 (3.1)			128 (100.0)		128	4.34	0.60
1.6～ (%)	1 (7.7)			7 (53.8)	2 (15.4)	3 (23.1)					13 (100.0)		13	4.15	0.77
1.8～ (%)						1 (100.0)					1 (100.0)		1	5.00	
2.0～ (%)				4 (66.7)	1 (16.7)		1 (16.7)				6 (100.0)		6	4.33	0.61
合計 (%)	56 (0.2)	1,294 (3.9)	1,871 (5.7)	22,014 (66.8)	3,515 (10.7)	3,704 (11.2)	209 (0.6)	263 (0.8)	13 (0.0)	33 (0.1)	32,972 (100.0)		32,972	4.14	0.49
記載なし (%)	7 (0.4)	151 (8.3)	126 (7.0)	1,289 (71.2)	111 (6.1)	119 (6.6)	2 (0.1)	2 (0.1)	3 (0.2)	1 (0.1)	1,811 (100.0)	188	1,999	4.00	0.46
総計 (%)	63 (0.2)	1,445 (4.2)	1,997 (5.7)	23,303 (67.0)	3,626 (10.4)	3,823 (11.0)	211 (0.6)	265 (0.8)	16 (0.0)	34 (0.1)	34,783 (100.0)	188	34,971	4.13	0.49
平均	0.83	0.80	0.85	0.88	0.92	0.92	0.94	0.94	1.06	0.90	0.88		0.88		
標準偏差	0.21	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.21	0.18	0.23	0.17	0.17		0.17		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査