

表 1938 透析時間(時間/回) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前アルブミン 濃度	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)		2 (20.0)	1 (10.0)	3 (30.0)		3 (30.0)	1 (10.0)				10 (100.0)		10	4.20	0.89
1.5～ (%)	2 (3.2)	16 (25.8)	6 (9.7)	32 (51.6)	1 (1.6)	3 (4.8)	1 (1.6)	1 (1.6)			62 (100.0)		62	3.77	0.69
2.0～ (%)	3 (1.0)	46 (15.6)	26 (8.8)	196 (66.7)	7 (2.4)	14 (4.8)		2 (0.7)			294 (100.0)		294	3.86	0.52
2.5～ (%)	6 (0.4)	188 (13.6)	119 (8.6)	918 (66.2)	77 (5.6)	74 (5.3)	1 (0.1)	4 (0.3)			1,387 (100.0)	5	1,392	3.92	0.49
3.0～ (%)	15 (0.2)	563 (6.4)	564 (6.4)	6,016 (68.4)	755 (8.6)	797 (9.1)	33 (0.4)	42 (0.5)	4 (0.0)	5 (0.1)	8,794 (100.0)	13	8,807	4.07	0.48
3.5～ (%)	47 (0.2)	1,012 (4.9)	1,202 (5.8)	13,609 (66.2)	2,146 (10.4)	2,216 (10.8)	123 (0.6)	174 (0.8)	11 (0.1)	20 (0.1)	20,560 (100.0)	25	20,585	4.12	0.50
4.0～ (%)	11 (0.2)	324 (4.5)	450 (6.3)	4,668 (65.3)	745 (10.4)	824 (11.5)	55 (0.8)	57 (0.8)	2 (0.0)	11 (0.2)	7,147 (100.0)	11	7,158	4.14	0.51
4.5～ (%)	2 (0.6)	22 (7.0)	30 (9.5)	196 (62.0)	25 (7.9)	36 (11.4)	4 (1.3)	1 (0.3)			316 (100.0)	1	317	4.07	0.52
5.0～ (%)			1 (5.6)	12 (66.7)	5 (27.8)						18 (100.0)		18	4.11	0.27
合計 (%)	86 (0.2)	2,173 (5.6)	2,399 (6.2)	25,650 (66.5)	3,761 (9.7)	3,967 (10.3)	218 (0.6)	281 (0.7)	17 (0.0)	36 (0.1)	38,588 (100.0)	55	38,643	4.10	0.50
記載なし (%)	6 (0.5)	109 (9.6)	80 (7.1)	784 (69.1)	87 (7.7)	65 (5.7)		3 (0.3)			1,134 (100.0)	169	1,303	3.98	0.45
総計 (%)	92 (0.2)	2,282 (5.7)	2,479 (6.2)	26,434 (66.5)	3,848 (9.7)	4,032 (10.2)	218 (0.5)	284 (0.7)	17 (0.0)	36 (0.1)	39,722 (100.0)	224	39,946	4.10	0.50
平均	3.53	3.52	3.61	3.63	3.68	3.68	3.74	3.69	3.61	3.74	3.64	3.60	3.64		
標準偏差	0.54	0.48	0.42	0.39	0.34	0.35	0.40	0.35	0.31	0.29	0.39	0.45	0.39		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査