

表 1942 透析時間(時間/回) PTH値(pg/mL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回) PTH測定法:intact-PTH

PTH値	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	2 (0.1)	129 (7.7)	118 (7.0)	1,066 (63.4)	155 (9.2)	180 (10.7)	14 (0.8)	14 (0.8)	2 (0.1)	1 (0.1)	1,681 (100.0)	2	1,683	4.09	0.54
20～ (%)	7 (0.3)	133 (6.1)	133 (6.1)	1,484 (67.7)	197 (9.0)	215 (9.8)	11 (0.5)	11 (0.5)	1 (0.0)		2,192 (100.0)	3	2,195	4.08	0.49
40～ (%)	7 (0.3)	165 (6.8)	142 (5.8)	1,621 (66.7)	211 (8.7)	251 (10.3)	11 (0.5)	22 (0.9)		1 (0.0)	2,431 (100.0)	6	2,437	4.09	0.52
60～ (%)	5 (0.2)	155 (6.0)	172 (6.6)	1,731 (66.9)	254 (9.8)	239 (9.2)	11 (0.4)	17 (0.7)	1 (0.0)	3 (0.1)	2,588 (100.0)	4	2,592	4.09	0.49
80～ (%)	1 (0.0)	156 (5.5)	179 (6.3)	1,917 (67.4)	281 (9.9)	277 (9.7)	13 (0.5)	18 (0.6)	1 (0.0)	2 (0.1)	2,845 (100.0)	1	2,846	4.10	0.48
100～ (%)	7 (0.3)	146 (5.2)	163 (5.8)	1,908 (68.4)	251 (9.0)	279 (10.0)	15 (0.5)	15 (0.5)	1 (0.0)	5 (0.2)	2,790 (100.0)	5	2,795	4.10	0.50
120～ (%)	2 (0.1)	137 (5.3)	165 (6.4)	1,703 (66.0)	279 (10.8)	258 (10.0)	18 (0.7)	17 (0.7)		1 (0.0)	2,580 (100.0)	1	2,581	4.11	0.49
140～ (%)	6 (0.3)	118 (5.1)	157 (6.8)	1,550 (66.8)	231 (9.9)	237 (10.2)	7 (0.3)	13 (0.6)	2 (0.1)	1 (0.0)	2,322 (100.0)	1	2,323	4.10	0.48
160～ (%)	5 (0.2)	108 (5.0)	148 (6.9)	1,438 (66.9)	212 (9.9)	198 (9.2)	20 (0.9)	14 (0.7)		5 (0.2)	2,148 (100.0)	2	2,150	4.11	0.51
180～ (%)	14 (0.3)	266 (5.3)	288 (5.8)	3,372 (67.4)	487 (9.7)	494 (9.9)	30 (0.6)	40 (0.8)	4 (0.1)	5 (0.1)	5,000 (100.0)	5	5,005	4.11	0.50
240～ (%)		5 (6.5)	5 (6.5)	47 (61.0)	6 (7.8)	12 (15.6)	1 (1.3)			1 (1.3)	77 (100.0)		77	4.16	0.61
241～ (%)	10 (0.3)	152 (5.2)	187 (6.3)	1,955 (66.3)	315 (10.7)	299 (10.1)	12 (0.4)	20 (0.7)			2,950 (100.0)	5	2,955	4.10	0.48
300～ (%)	7 (0.4)	80 (4.7)	103 (6.0)	1,157 (67.7)	184 (10.8)	162 (9.5)	6 (0.4)	11 (0.6)			1,710 (100.0)	4	1,714	4.10	0.47
360～ (%)	4 (0.4)	59 (5.7)	66 (6.4)	687 (66.1)	91 (8.8)	105 (10.1)	11 (1.1)	13 (1.3)	2 (0.2)	1 (0.1)	1,039 (100.0)	3	1,042	4.12	0.55
420～ (%)	1 (0.2)	30 (5.1)	47 (8.0)	368 (62.4)	70 (11.9)	64 (10.8)	5 (0.8)	4 (0.7)		1 (0.2)	590 (100.0)	1	591	4.13	0.52
480～ (%)		5 (3.4)	9 (6.2)	99 (67.8)	14 (9.6)	18 (12.3)	1 (0.7)				146 (100.0)		146	4.13	0.44
500～ (%)	1 (0.4)	13 (5.5)	11 (4.6)	160 (67.5)	21 (8.9)	29 (12.2)	1 (0.4)	1 (0.4)			237 (100.0)		237	4.11	0.49
540～ (%)	1 (0.4)	9 (3.6)	13 (5.2)	167 (66.3)	25 (9.9)	34 (13.5)	2 (0.8)	1 (0.4)			252 (100.0)		252	4.16	0.47
600～ (%)	2 (0.5)	21 (5.0)	20 (4.7)	289 (68.3)	38 (9.0)	46 (10.9)	2 (0.5)	4 (0.9)	1 (0.2)		423 (100.0)		423	4.13	0.49
800～ (%)	1 (0.3)	20 (5.7)	27 (7.7)	218 (62.3)	41 (11.7)	39 (11.1)	2 (0.6)	2 (0.6)			350 (100.0)		350	4.11	0.50
合計 (%)	83 (0.2)	1,907 (5.6)	2,153 (6.3)	22,937 (66.8)	3,363 (9.8)	3,436 (10.0)	193 (0.6)	237 (0.7)	15 (0.0)	27 (0.1)	34,351 (100.0)	43	34,394	4.10	0.50
記載なし (%)	3 (0.4)	84 (12.2)	51 (7.4)	504 (73.3)	13 (1.9)	32 (4.7)		1 (0.1)			688 (100.0)	46	734	3.90	0.43
総計 (%)	86 (0.2)	1,991 (5.7)	2,204 (6.3)	23,441 (66.9)	3,376 (9.6)	3,468 (9.9)	193 (0.6)	238 (0.7)	15 (0.0)	27 (0.1)	35,039 (100.0)	89	35,128	4.10	0.50
平均	204.40	167.62	177.20	176.47	184.12	180.08	182.32	183.46	194.27	154.81	177.27	165.56	177.26		
標準偏差	164.80	170.44	177.96	165.54	192.38	165.17	164.78	186.37	181.61	94.58	169.51	119.90	169.45		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査