

表 1948 透析時間(時間/回) 透析前収縮期血圧(mmHg)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前収縮期血圧	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)				2 (100.0)							2 (100.0)		2	4.00	
60～ (%)		9 (7.8)	9 (7.8)	67 (58.3)	16 (13.9)	12 (10.4)	1 (0.9)			1 (0.9)	115 (100.0)		115	4.13	0.61
80～ (%)	1 (0.2)	38 (6.2)	38 (6.2)	404 (65.9)	46 (7.5)	76 (12.4)	2 (0.3)	8 (1.3)			613 (100.0)	2	615	4.12	0.52
100～ (%)	2 (0.1)	169 (6.0)	167 (6.0)	1,842 (65.9)	273 (9.8)	297 (10.6)	17 (0.6)	25 (0.9)	1 (0.0)	2 (0.1)	2,795 (100.0)	5	2,800	4.11	0.51
120～ (%)	26 (0.3)	411 (5.4)	484 (6.3)	5,052 (66.2)	714 (9.4)	827 (10.8)	43 (0.6)	62 (0.8)	3 (0.0)	7 (0.1)	7,629 (100.0)	10	7,639	4.11	0.51
140～ (%)	30 (0.3)	639 (5.6)	701 (6.1)	7,574 (66.3)	1,133 (9.9)	1,183 (10.4)	58 (0.5)	89 (0.8)	5 (0.0)	12 (0.1)	11,424 (100.0)	9	11,433	4.11	0.51
160～ (%)	20 (0.2)	465 (5.6)	480 (5.8)	5,627 (67.8)	796 (9.6)	792 (9.5)	44 (0.5)	60 (0.7)	6 (0.1)	7 (0.1)	8,297 (100.0)	11	8,308	4.10	0.50
180～ (%)	4 (0.1)	186 (5.9)	200 (6.3)	2,117 (67.1)	289 (9.2)	325 (10.3)	10 (0.3)	18 (0.6)	1 (0.0)	4 (0.1)	3,154 (100.0)		3,154	4.09	0.50
200～ (%)	2 (0.2)	53 (6.5)	61 (7.4)	547 (66.6)	70 (8.5)	83 (10.1)	4 (0.5)			1 (0.1)	821 (100.0)	1	822	4.06	0.48
220～ (%)	2 (0.9)	14 (6.5)	11 (5.1)	148 (68.5)	19 (8.8)	19 (8.8)	2 (0.9)	1 (0.5)			216 (100.0)		216	4.08	0.48
合計 (%)	87 (0.2)	1,984 (5.7)	2,151 (6.1)	23,380 (66.7)	3,356 (9.6)	3,614 (10.3)	181 (0.5)	263 (0.8)	16 (0.0)	34 (0.1)	35,066 (100.0)	38	35,104	4.10	0.50
記載なし (%)	5 (0.1)	298 (6.4)	328 (7.0)	3,054 (65.6)	492 (10.6)	418 (9.0)	37 (0.8)	21 (0.5)	1 (0.0)	2 (0.0)	4,656 (100.0)	186	4,842	4.07	0.49
総計 (%)	92 (0.2)	2,282 (5.7)	2,479 (6.2)	26,434 (66.5)	3,848 (9.7)	4,032 (10.2)	218 (0.5)	284 (0.7)	17 (0.0)	36 (0.1)	39,722 (100.0)	224	39,946	4.10	0.50
平均	150.31	150.70	150.76	150.90	150.53	149.67	149.05	146.40	152.31	149.82	150.67	145.00	150.67		
標準偏差	24.64	25.62	25.53	25.02	24.42	25.15	26.12	23.44	16.47	27.03	25.04	25.84	25.04		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査