

表 1949 透析時間(時間/回) 透析前拡張期血圧(mmHg)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前拡張 期血圧	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		1 (14.3)		3 (42.9)	1 (14.3)	2 (28.6)					7 (100.0)		7	4.21	0.70
20～ (%)		10 (8.3)	7 (5.8)	86 (71.7)	12 (10.0)	5 (4.2)					120 (100.0)	1	121	4.00	0.40
40～ (%)	5 (0.2)	204 (7.6)	184 (6.9)	1,801 (67.3)	210 (7.8)	231 (8.6)	12 (0.4)	25 (0.9)	2 (0.1)	2 (0.1)	2,676 (100.0)	4	2,680	4.06	0.51
60～ (%)	47 (0.3)	981 (6.6)	1,028 (6.9)	9,977 (66.7)	1,320 (8.8)	1,421 (9.5)	66 (0.4)	95 (0.6)	5 (0.0)	15 (0.1)	14,955 (100.0)	17	14,972	4.07	0.51
80～ (%)	20 (0.2)	444 (4.9)	499 (5.5)	6,099 (67.8)	886 (9.8)	938 (10.4)	43 (0.5)	60 (0.7)	3 (0.0)	6 (0.1)	8,998 (100.0)	5	9,003	4.11	0.48
90～ (%)	9 (0.2)	218 (4.1)	264 (5.0)	3,521 (66.3)	554 (10.4)	644 (12.1)	34 (0.6)	56 (1.1)	4 (0.1)	5 (0.1)	5,309 (100.0)	8	5,317	4.16	0.51
100～ (%)	5 (0.2)	115 (4.3)	150 (5.6)	1,695 (62.8)	342 (12.7)	335 (12.4)	22 (0.8)	26 (1.0)	2 (0.1)	6 (0.2)	2,698 (100.0)	3	2,701	4.17	0.53
120～ (%)		9 (5.3)	7 (4.1)	111 (65.7)	16 (9.5)	23 (13.6)	3 (1.8)				169 (100.0)		169	4.16	0.50
140～ (%)			1 (8.3)	6 (50.0)	1 (8.3)	4 (33.3)					12 (100.0)		12	4.38	0.52
合計 (%)	86 (0.2)	1,982 (5.7)	2,140 (6.1)	23,299 (66.7)	3,342 (9.6)	3,603 (10.3)	180 (0.5)	262 (0.7)	16 (0.0)	34 (0.1)	34,944 (100.0)	38	34,982	4.10	0.50
記載なし (%)	6 (0.1)	300 (6.3)	339 (7.1)	3,135 (65.6)	506 (10.6)	429 (9.0)	38 (0.8)	22 (0.5)	1 (0.0)	2 (0.0)	4,778 (100.0)	186	4,964	4.07	0.49
総計 (%)	92 (0.2)	2,282 (5.7)	2,479 (6.2)	26,434 (66.5)	3,848 (9.7)	4,032 (10.2)	218 (0.5)	284 (0.7)	17 (0.0)	36 (0.1)	39,722 (100.0)	224	39,946	4.10	0.50
平均	77.74	76.37	77.53	79.00	80.97	80.86	82.68	80.76	79.19	80.76	79.17	76.55	79.17		
標準偏差	13.17	14.54	14.50	14.60	14.88	14.92	15.57	14.91	17.51	16.91	14.70	18.16	14.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査