

表 1953 血流量(ml/分) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	19	385	963	8,073	2,530	15,381	63,434	22,660	22,174	2,135	2,045	3,683	363	468	144,313	2,720	147,033	210.85	36.54
(%)	(0.0)	(0.3)	(0.7)	(5.6)	(1.8)	(10.7)	(44.0)	(15.7)	(15.4)	(1.5)	(1.4)	(2.6)	(0.3)	(0.3)	(100.0)				
女性	25	354	1,185	9,900	3,371	15,104	37,056	6,886	4,886	398	292	582	66	250	80,355	1,583	81,938	194.31	33.68
(%)	(0.0)	(0.4)	(1.5)	(12.3)	(4.2)	(18.8)	(46.1)	(8.6)	(6.1)	(0.5)	(0.4)	(0.7)	(0.1)	(0.3)	(100.0)				
合計	44	739	2,148	17,973	5,901	30,485	100,490	29,546	27,060	2,533	2,337	4,265	429	718	224,668	4,303	228,971	204.94	36.42
(%)	(0.0)	(0.3)	(1.0)	(8.0)	(2.6)	(13.6)	(44.7)	(13.2)	(12.0)	(1.1)	(1.0)	(1.9)	(0.2)	(0.3)	(100.0)				
記載なし																			
(%)																			
総計	44	739	2,148	17,973	5,901	30,485	100,490	29,546	27,060	2,533	2,337	4,265	429	718	224,668	4,303	228,971	204.94	36.42
(%)	(0.0)	(0.3)	(1.0)	(8.0)	(2.6)	(13.6)	(44.7)	(13.2)	(12.0)	(1.1)	(1.0)	(1.9)	(0.2)	(0.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査