

表 1971 血流量(ml/分) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前補正 カルシウム濃度	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)	2 (0.2)	12 (1.4)	18 (2.1)	81 (9.4)	31 (3.6)	135 (15.6)	383 (44.3)	92 (10.6)	74 (8.6)	7 (0.8)	6 (0.7)	19 (2.2)	2 (0.2)	2 (0.2)	864 (100.0)	10	874	198.80	38.32
7.0～ (%)		10 (0.8)	21 (1.7)	109 (8.7)	26 (2.1)	171 (13.7)	559 (44.6)	156 (12.5)	148 (11.8)	11 (0.9)	15 (1.2)	21 (1.7)	1 (0.1)	4 (0.3)	1,252 (100.0)	14	1,266	203.20	37.77
7.5～ (%)		26 (0.5)	61 (1.2)	412 (8.4)	119 (2.4)	687 (14.0)	2,189 (44.6)	628 (12.8)	569 (11.6)	44 (0.9)	71 (1.4)	82 (1.7)	8 (0.2)	11 (0.2)	4,907 (100.0)	64	4,971	203.67	35.66
8.0～ (%)	4 (0.0)	56 (0.3)	159 (1.0)	1,343 (8.3)	399 (2.5)	2,136 (13.3)	7,327 (45.5)	2,046 (12.7)	1,913 (11.9)	199 (1.2)	166 (1.0)	275 (1.7)	37 (0.2)	36 (0.2)	16,096 (100.0)	194	16,290	204.35	35.57
8.4～ (%)		13 (0.3)	58 (1.3)	356 (7.7)	121 (2.6)	599 (13.0)	2,083 (45.0)	624 (13.5)	575 (12.4)	60 (1.3)	45 (1.0)	76 (1.6)	7 (0.2)	8 (0.2)	4,625 (100.0)	51	4,676	204.70	34.49
8.5～ (%)	10 (0.0)	185 (0.3)	530 (1.0)	4,301 (8.1)	1,348 (2.5)	7,150 (13.4)	23,748 (44.6)	7,086 (13.3)	6,453 (12.1)	650 (1.2)	521 (1.0)	1,009 (1.9)	104 (0.2)	147 (0.3)	53,242 (100.0)	660	53,902	204.88	36.10
9.0～ (%)	7 (0.0)	195 (0.3)	536 (0.8)	4,968 (7.7)	1,619 (2.5)	8,549 (13.3)	28,764 (44.6)	8,637 (13.4)	8,157 (12.6)	760 (1.2)	717 (1.1)	1,273 (2.0)	120 (0.2)	197 (0.3)	64,499 (100.0)	737	65,236	205.77	36.13
9.5～ (%)	8 (0.0)	107 (0.3)	356 (0.8)	3,054 (7.3)	1,042 (2.5)	5,554 (13.2)	18,635 (44.5)	5,818 (13.9)	5,241 (12.5)	502 (1.2)	487 (1.2)	910 (2.2)	84 (0.2)	119 (0.3)	41,917 (100.0)	487	42,404	206.28	35.96
10.0～ (%)	2 (0.0)	18 (0.3)	40 (0.8)	378 (7.3)	154 (3.0)	686 (13.2)	2,342 (45.1)	719 (13.9)	607 (11.7)	51 (1.0)	65 (1.3)	111 (2.1)	6 (0.1)	10 (0.2)	5,189 (100.0)	38	5,227	205.20	34.78
10.1～ (%)	3 (0.0)	30 (0.2)	121 (0.9)	1,029 (7.8)	396 (3.0)	1,816 (13.8)	5,966 (45.4)	1,658 (12.6)	1,550 (11.8)	120 (0.9)	128 (1.0)	247 (1.9)	25 (0.2)	47 (0.4)	13,136 (100.0)	141	13,277	204.52	35.88
10.5～ (%)	1 (0.0)	16 (0.3)	72 (1.1)	533 (8.4)	199 (3.1)	967 (15.2)	2,905 (45.6)	795 (12.5)	649 (10.2)	51 (0.8)	53 (0.8)	105 (1.6)	11 (0.2)	17 (0.3)	6,374 (100.0)	79	6,453	202.24	34.70
11.0～ (%)	1 (0.0)	16 (0.7)	27 (1.3)	245 (11.4)	74 (3.5)	353 (16.5)	993 (46.3)	213 (9.9)	168 (7.8)	8 (0.4)	22 (1.0)	21 (1.0)	2 (0.1)	1 (0.0)	2,144 (100.0)	21	2,165	196.48	31.92
11.5～ (%)		3 (0.4)	12 (1.6)	107 (14.1)	26 (3.4)	129 (17.0)	334 (43.9)	76 (10.0)	54 (7.1)	3 (0.4)	3 (0.4)	8 (1.1)	3 (0.4)	2 (0.3)	760 (100.0)	9	769	195.56	35.52
12.0～ (%)		3 (0.6)	10 (1.9)	89 (16.6)	16 (3.0)	90 (16.8)	237 (44.3)	40 (7.5)	38 (7.1)	3 (0.6)		6 (1.1)	2 (0.4)	1 (0.2)	535 (100.0)	4	539	193.14	34.79
合計 (%)	38 (0.0)	690 (0.3)	2,021 (0.9)	17,005 (7.9)	5,570 (2.6)	29,022 (13.5)	96,465 (44.8)	28,588 (13.3)	26,196 (12.2)	2,469 (1.1)	2,299 (1.1)	4,163 (1.9)	412 (0.2)	602 (0.3)	215,540 (100.0)	2,509	218,049	205.08	35.92
記載なし (%)	6 (0.1)	49 (0.5)	127 (1.4)	968 (10.6)	331 (3.6)	1,463 (16.0)	4,025 (44.1)	958 (10.5)	864 (9.5)	64 (0.7)	38 (0.4)	102 (1.1)	17 (0.2)	116 (1.3)	9,128 (100.0)	1,794	10,922	201.64	46.53
総計 (%)	44 (0.0)	739 (0.3)	2,148 (1.0)	17,973 (8.0)	5,901 (2.6)	30,485 (13.6)	100,490 (44.7)	29,546 (13.2)	27,060 (12.0)	2,533 (1.1)	2,337 (1.0)	4,265 (1.9)	429 (0.2)	718 (0.3)	224,668 (100.0)	4,303	228,971	204.94	36.42
平均	9.11	9.08	9.15	9.19	9.22	9.20	9.19	9.18	9.17	9.13	9.17	9.20	9.17	9.20	9.18	9.16	9.18		
標準偏差	0.96	0.85	0.83	0.80	0.79	0.77	0.74	0.71	0.69	0.65	0.70	0.69	0.73	0.69	0.74	0.73	0.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査