

表 1979 血流量(ml/分) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前収縮期血圧	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)			1 (2.9)	9 (25.7)		7 (20.0)	14 (40.0)	1 (2.9)	3 (8.6)						35 (100.0)		35	186.00	30.31
60～ (%)		6 (2.2)	6 (2.2)	47 (17.5)	14 (5.2)	49 (18.2)	103 (38.3)	19 (7.1)	18 (6.7)	3 (1.1)	1 (0.4)	2 (0.7)	1 (0.4)		269 (100.0)	2	271	188.85	35.11
80～ (%)	4 (0.2)	18 (0.8)	45 (1.9)	325 (13.8)	95 (4.0)	425 (18.1)	983 (41.8)	201 (8.5)	194 (8.2)	9 (0.4)	10 (0.4)	31 (1.3)	3 (0.1)	9 (0.4)	2,352 (100.0)	25	2,377	194.90	38.32
100～ (%)	6 (0.0)	84 (0.6)	202 (1.6)	1,443 (11.1)	424 (3.3)	1,903 (14.6)	5,709 (43.9)	1,472 (11.3)	1,285 (9.9)	125 (1.0)	103 (0.8)	182 (1.4)	19 (0.1)	41 (0.3)	12,998 (100.0)	157	13,155	199.79	37.08
120～ (%)	11 (0.0)	148 (0.4)	444 (1.1)	3,521 (8.6)	1,117 (2.7)	5,685 (13.8)	18,192 (44.2)	5,396 (13.1)	4,881 (11.9)	464 (1.1)	391 (1.0)	732 (1.8)	68 (0.2)	90 (0.2)	41,140 (100.0)	436	41,576	203.83	35.55
140～ (%)	15 (0.0)	170 (0.3)	535 (0.8)	4,759 (7.5)	1,520 (2.4)	8,340 (13.1)	28,617 (45.0)	8,692 (13.7)	7,950 (12.5)	742 (1.2)	723 (1.1)	1,253 (2.0)	121 (0.2)	178 (0.3)	63,615 (100.0)	588	64,203	205.93	35.86
160～ (%)	1 (0.0)	129 (0.3)	369 (0.8)	3,193 (6.9)	1,094 (2.4)	5,926 (12.8)	21,040 (45.3)	6,360 (13.7)	6,055 (13.0)	551 (1.2)	548 (1.2)	953 (2.1)	89 (0.2)	124 (0.3)	46,432 (100.0)	411	46,843	206.71	35.58
180～ (%)	3 (0.0)	58 (0.3)	162 (0.9)	1,268 (7.1)	445 (2.5)	2,354 (13.2)	7,943 (44.5)	2,436 (13.6)	2,308 (12.9)	217 (1.2)	200 (1.1)	381 (2.1)	37 (0.2)	50 (0.3)	17,862 (100.0)	140	18,002	206.36	36.24
200～ (%)		13 (0.3)	43 (1.0)	322 (7.2)	95 (2.1)	590 (13.2)	1,954 (43.6)	618 (13.8)	580 (12.9)	61 (1.4)	66 (1.5)	112 (2.5)	8 (0.2)	20 (0.4)	4,482 (100.0)	33	4,515	207.67	38.49
220～ (%)		1 (0.1)	6 (0.7)	63 (7.1)	24 (2.7)	102 (11.5)	419 (47.1)	127 (14.3)	98 (11.0)	6 (0.7)	16 (1.8)	21 (2.4)	5 (0.6)	2 (0.2)	890 (100.0)	4	894	207.11	36.17
合計 (%)	40 (0.0)	627 (0.3)	1,813 (1.0)	14,950 (7.9)	4,828 (2.5)	25,381 (13.4)	84,974 (44.7)	25,322 (13.3)	23,372 (12.3)	2,178 (1.1)	2,058 (1.1)	3,667 (1.9)	351 (0.2)	514 (0.3)	190,075 (100.0)	1,796	191,871	205.17	36.01
記載なし (%)	4 (0.0)	112 (0.3)	335 (1.0)	3,023 (8.7)	1,073 (3.1)	5,104 (14.8)	15,516 (44.9)	4,224 (12.2)	3,688 (10.7)	355 (1.0)	279 (0.8)	598 (1.7)	78 (0.2)	204 (0.6)	34,593 (100.0)	2,507	37,100	203.65	38.55
総計 (%)	44 (0.0)	739 (0.3)	2,148 (1.0)	17,973 (8.0)	5,901 (2.6)	30,485 (13.6)	100,490 (44.7)	29,546 (13.2)	27,060 (12.0)	2,533 (1.1)	2,337 (1.0)	4,265 (1.9)	429 (0.2)	718 (0.3)	224,668 (100.0)	4,303	228,971	204.94	36.42
平均	134.78	145.83	147.36	148.23	149.18	150.61	151.85	152.82	153.21	153.28	154.78	154.42	154.44	153.05	151.67	149.05	151.64		
標準偏差	24.72	27.59	26.32	25.33	25.01	24.58	23.84	23.28	23.24	23.33	23.55	23.56	24.20	25.08	24.02	23.57	24.02		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査