

表 1982 血流量(ml/分) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性		19	33	496	203	1,259	7,471	4,408	6,791	869	814	2,015	302	169	24,849	345	25,194	231.77	40.91
(%)		(0.1)	(0.1)	(2.0)	(0.8)	(5.1)	(30.1)	(17.7)	(27.3)	(3.5)	(3.3)	(8.1)	(1.2)	(0.7)	(100.0)				
女性	1	18	61	846	375	1,687	6,076	2,199	2,336	209	206	450	43	33	14,540	212	14,752	211.20	35.84
(%)	(0.0)	(0.1)	(0.4)	(5.8)	(2.6)	(11.6)	(41.8)	(15.1)	(16.1)	(1.4)	(1.4)	(3.1)	(0.3)	(0.2)	(100.0)				
合計	1	37	94	1,342	578	2,946	13,547	6,607	9,127	1,078	1,020	2,465	345	202	39,389	557	39,946	224.18	40.35
(%)	(0.0)	(0.1)	(0.2)	(3.4)	(1.5)	(7.5)	(34.4)	(16.8)	(23.2)	(2.7)	(2.6)	(6.3)	(0.9)	(0.5)	(100.0)				
記載なし																			
(%)																			
総計	1	37	94	1,342	578	2,946	13,547	6,607	9,127	1,078	1,020	2,465	345	202	39,389	557	39,946	224.18	40.35
(%)	(0.0)	(0.1)	(0.2)	(3.4)	(1.5)	(7.5)	(34.4)	(16.8)	(23.2)	(2.7)	(2.6)	(6.3)	(0.9)	(0.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査