

表 1983 血流量(ml/分) 年齢(歳)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)							2 (100.0)								2 (100.0)		2	200.00	
15歳～ (%)				4 (2.5)	3 (1.9)	10 (6.3)	42 (26.3)	25 (15.6)	44 (27.5)	5 (3.1)	4 (2.5)	19 (11.9)	3 (1.9)	1 (0.6)	160 (100.0)	2	162	234.66	44.12
30歳～ (%)		1 (0.0)	2 (0.1)	26 (1.1)	11 (0.4)	70 (2.8)	486 (19.8)	461 (18.7)	778 (31.6)	110 (4.5)	143 (5.8)	297 (12.1)	51 (2.1)	23 (0.9)	2,459 (100.0)	29	2,488	244.09	42.51
45歳～ (%)		4 (0.0)	7 (0.1)	95 (1.1)	52 (0.6)	351 (3.9)	2,401 (26.5)	1,634 (18.1)	2,706 (29.9)	342 (3.8)	342 (3.8)	896 (9.9)	143 (1.6)	72 (0.8)	9,045 (100.0)	128	9,173	237.35	41.51
60歳～ (%)	1 (0.0)	16 (0.1)	32 (0.2)	485 (2.6)	220 (1.2)	1,354 (7.2)	6,849 (36.5)	3,332 (17.8)	4,363 (23.3)	485 (2.6)	429 (2.3)	988 (5.3)	114 (0.6)	91 (0.5)	18,759 (100.0)	255	19,014	223.20	37.83
75歳～ (%)		11 (0.1)	46 (0.5)	683 (7.9)	270 (3.1)	1,084 (12.6)	3,642 (42.3)	1,134 (13.2)	1,212 (14.1)	132 (1.5)	101 (1.2)	254 (2.9)	34 (0.4)	14 (0.2)	8,617 (100.0)	137	8,754	207.86	36.12
90歳～ (%)		5 (1.5)	7 (2.0)	49 (14.2)	22 (6.4)	77 (22.4)	122 (35.5)	21 (6.1)	24 (7.0)	4 (1.2)	1 (0.3)	11 (3.2)		1 (0.3)	344 (100.0)	6	350	192.85	38.80
合計 (%)	1 (0.0)	37 (0.1)	94 (0.2)	1,342 (3.4)	578 (1.5)	2,946 (7.5)	13,544 (34.4)	6,607 (16.8)	9,127 (23.2)	1,078 (2.7)	1,020 (2.6)	2,465 (6.3)	345 (0.9)	202 (0.5)	39,386 (100.0)	557	39,943	224.18	40.36
不明 (%)							3 (100.0)								3 (100.0)		3	200.00	
記載なし (%)																			
総計 (%)	1 (0.0)	37 (0.1)	94 (0.2)	1,342 (3.4)	578 (1.5)	2,946 (7.5)	13,547 (34.4)	6,607 (16.8)	9,127 (23.2)	1,078 (2.7)	1,020 (2.6)	2,465 (6.3)	345 (0.9)	202 (0.5)	39,389 (100.0)	557	39,946	224.18	40.35
平均	68.00	72.51	75.34	74.07	72.89	70.53	67.34	63.59	61.82	60.67	59.02	59.11	57.57	58.72	64.96	65.97	64.98		
標準偏差		13.09	11.54	11.29	11.56	11.54	11.52	11.84	11.88	12.03	12.22	12.33	11.95	12.09	12.37	12.47	12.38		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査