

表 1985 血流量(ml/分) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	1 (0.0)	9 (0.1)	26 (0.2)	356 (2.4)	204 (1.4)	950 (6.4)	4,938 (33.3)	2,745 (18.5)	3,668 (24.7)	402 (2.7)	410 (2.8)	921 (6.2)	120 (0.8)	85 (0.6)	14,835 (100.0)	241	15,076	226.36	39.55
慢性腎盂腎炎 (%)		1 (0.2)	1 (0.2)	12 (2.9)	9 (2.2)	40 (9.6)	134 (32.2)	66 (15.9)	100 (24.0)	17 (4.1)	14 (3.4)	18 (4.3)	2 (0.5)	2 (0.5)	416 (100.0)	6	422	222.70	38.67
急速進行性糸球 体腎炎 (%)				12 (4.3)	1 (0.4)	22 (7.9)	105 (37.5)	44 (15.7)	62 (22.1)	6 (2.1)	7 (2.5)	17 (6.1)	2 (0.7)	2 (0.7)	280 (100.0)	4	284	223.07	41.66
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)				14 (3.9)	9 (2.5)	43 (12.0)	135 (37.8)	69 (19.3)	61 (17.1)	6 (1.7)	7 (2.0)	11 (3.1)	2 (0.6)		357 (100.0)	2	359	214.17	33.77
その他の分類不 能の腎炎 (%)		1 (0.5)	3 (1.6)	7 (3.6)	3 (1.6)	17 (8.8)	58 (30.1)	31 (16.1)	33 (17.1)	9 (4.7)	7 (3.6)	19 (9.8)	5 (2.6)		193 (100.0)	2	195	226.63	46.12
多発性嚢胞腎 (%)		1 (0.1)	1 (0.1)	42 (2.9)	17 (1.2)	88 (6.1)	487 (33.7)	248 (17.2)	366 (25.3)	37 (2.6)	39 (2.7)	91 (6.3)	18 (1.2)	11 (0.8)	1,446 (100.0)	18	1,464	226.94	40.67
腎硬化症 (%)		4 (0.1)	18 (0.6)	168 (5.9)	69 (2.4)	267 (9.4)	984 (34.5)	407 (14.3)	584 (20.5)	99 (3.5)	47 (1.6)	160 (5.6)	29 (1.0)	13 (0.5)	2,849 (100.0)	37	2,886	218.93	42.09
悪性高血圧 (%)				5 (1.6)	6 (1.9)	19 (6.2)	95 (30.8)	50 (16.2)	90 (29.2)	11 (3.6)	4 (1.3)	22 (7.1)	3 (1.0)	3 (1.0)	308 (100.0)	4	312	229.95	42.00
糖尿病性腎症 (%)		12 (0.1)	26 (0.2)	501 (3.9)	165 (1.3)	1,011 (7.8)	4,623 (35.6)	2,092 (16.1)	2,914 (22.4)	342 (2.6)	316 (2.4)	808 (6.2)	109 (0.8)	62 (0.5)	12,981 (100.0)	192	13,173	223.10	40.21
SLE腎炎 (%)			2 (0.6)	12 (3.4)	7 (2.0)	43 (12.1)	146 (41.0)	48 (13.5)	60 (16.9)	10 (2.8)	12 (3.4)	15 (4.2)		1 (0.3)	356 (100.0)	7	363	215.69	36.22
アミロイド腎 (%)			1 (1.7)	3 (5.1)		9 (15.3)	21 (35.6)	9 (15.3)	14 (23.7)			2 (3.4)			59 (100.0)		59	212.71	34.18
痛風腎 (%)				4 (2.6)	1 (0.7)	6 (3.9)	41 (27.0)	32 (21.1)	42 (27.6)	6 (3.9)	4 (2.6)	14 (9.2)	2 (1.3)		152 (100.0)	2	154	232.34	37.69
先天性代謝異常 による腎不全 (%)				1 (2.3)	1 (2.3)	2 (4.5)	14 (31.8)	10 (22.7)	14 (31.8)			2 (4.5)			44 (100.0)		44	222.73	30.45
腎・尿路結核 (%)						3 (13.6)	5 (22.7)	6 (27.3)	7 (31.8)	1 (4.5)					22 (100.0)		22	224.09	26.31
腎・尿路結石 (%)					1 (1.5)	10 (14.7)	20 (29.4)	14 (20.6)	17 (25.0)	1 (1.5)		5 (7.4)			68 (100.0)	1	69	222.06	33.39
腎・尿路腫瘍 (%)				1 (1.2)		5 (5.9)	28 (32.9)	16 (18.8)	25 (29.4)	1 (1.2)	3 (3.5)	6 (7.1)			85 (100.0)		85	227.88	33.13
閉塞性尿路障害 (%)				1 (1.4)	1 (1.4)	3 (4.1)	23 (31.5)	10 (13.7)	19 (26.0)	3 (4.1)	5 (6.8)	7 (9.6)	1 (1.4)		73 (100.0)	1	74	233.70	39.14
骨髄腫 (%)				3 (15.8)		2 (10.5)	9 (47.4)	2 (10.5)	2 (10.5)		1 (5.3)				19 (100.0)		19	202.11	34.09
腎形成不全 (%)				7 (7.1)	1 (1.0)	4 (4.0)	25 (25.3)	24 (24.2)	22 (22.2)	6 (6.1)	2 (2.0)	6 (6.1)	2 (2.0)		99 (100.0)	2	101	226.77	41.55
不明 (%)		7 (0.2)	13 (0.4)	152 (4.4)	60 (1.7)	306 (8.9)	1,234 (35.7)	449 (13.0)	729 (21.1)	77 (2.2)	97 (2.8)	272 (7.9)	40 (1.2)	18 (0.5)	3,454 (100.0)	26	3,480	223.10	43.23
再導入 (%)				4 (1.0)	2 (0.5)	24 (5.9)	123 (30.0)	85 (20.7)	101 (24.6)	19 (4.6)	17 (4.1)	28 (6.8)	4 (1.0)	3 (0.7)	410 (100.0)	6	416	232.68	40.64
その他 (%)		2 (0.2)	3 (0.3)	37 (4.2)	21 (2.4)	72 (8.2)	299 (33.9)	150 (17.0)	197 (22.3)	25 (2.8)	28 (3.2)	41 (4.6)	6 (0.7)	2 (0.2)	883 (100.0)	6	889	220.76	38.77
合計 (%)	1 (0.0)	37 (0.1)	94 (0.2)	1,342 (3.4)	578 (1.5)	2,946 (7.5)	13,547 (34.4)	6,607 (16.8)	9,127 (23.2)	1,078 (2.7)	1,020 (2.6)	2,465 (6.3)	345 (0.9)	202 (0.5)	39,389 (100.0)	557	39,946	224.18	40.35
記載なし (%)																			
総計 (%)	1 (0.0)	37 (0.1)	94 (0.2)	1,342 (3.4)	578 (1.5)	2,946 (7.5)	13,547 (34.4)	6,607 (16.8)	9,127 (23.2)	1,078 (2.7)	1,020 (2.6)	2,465 (6.3)	345 (0.9)	202 (0.5)	39,389 (100.0)	557	39,946	224.18	40.35

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査