

表 1987 血流量(ml/分) 身長(cm)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

身長	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
130未満 (%)		1 (2.6)		4 (10.5)	2 (5.3)	6 (15.8)	14 (36.8)	5 (13.2)	4 (10.5)		1 (2.6)	1 (2.6)			38 (100.0)		38	201.05	39.85
130～ (%)			1 (1.4)	12 (17.4)	2 (2.9)	14 (20.3)	28 (40.6)	2 (2.9)	7 (10.1)	1 (1.4)		2 (2.9)			69 (100.0)	1	70	194.93	35.67
135～ (%)			3 (1.0)	50 (17.5)	18 (6.3)	51 (17.8)	107 (37.4)	22 (7.7)	24 (8.4)	4 (1.4)	3 (1.0)	4 (1.4)			286 (100.0)	3	289	193.90	34.12
140～ (%)	1 (0.1)	3 (0.3)	10 (0.9)	139 (12.0)	50 (4.3)	200 (17.3)	471 (40.7)	110 (9.5)	118 (10.2)	13 (1.1)	11 (0.9)	29 (2.5)	3 (0.3)		1,158 (100.0)	5	1,163	199.71	35.40
145～ (%)		8 (0.3)	19 (0.6)	241 (8.1)	110 (3.7)	400 (13.4)	1,272 (42.7)	382 (12.8)	387 (13.0)	40 (1.3)	30 (1.0)	80 (2.7)	3 (0.1)	5 (0.2)	2,977 (100.0)	18	2,995	205.71	35.35
150～ (%)		5 (0.1)	17 (0.3)	264 (5.1)	122 (2.4)	583 (11.3)	2,289 (44.4)	781 (15.1)	796 (15.4)	66 (1.3)	63 (1.2)	151 (2.9)	13 (0.3)	11 (0.2)	5,161 (100.0)	51	5,212	210.98	34.47
155～ (%)		6 (0.1)	10 (0.2)	181 (3.0)	93 (1.5)	571 (9.5)	2,369 (39.2)	1,054 (17.5)	1,182 (19.6)	151 (2.5)	115 (1.9)	248 (4.1)	34 (0.6)	26 (0.4)	6,040 (100.0)	39	6,079	218.80	37.11
160～ (%)		5 (0.1)	5 (0.1)	170 (2.4)	70 (1.0)	421 (5.9)	2,550 (35.8)	1,296 (18.2)	1,767 (24.8)	175 (2.5)	180 (2.5)	413 (5.8)	46 (0.6)	34 (0.5)	7,132 (100.0)	45	7,177	225.23	37.60
165～ (%)		2 (0.0)	10 (0.1)	93 (1.4)	34 (0.5)	272 (4.1)	1,938 (29.0)	1,313 (19.7)	1,918 (28.7)	229 (3.4)	203 (3.0)	535 (8.0)	85 (1.3)	44 (0.7)	6,676 (100.0)	46	6,722	233.28	39.53
170～ (%)		3 (0.1)	3 (0.1)	36 (0.8)	22 (0.5)	146 (3.1)	1,049 (22.1)	865 (18.2)	1,563 (32.9)	216 (4.5)	220 (4.6)	499 (10.5)	84 (1.8)	49 (1.0)	4,755 (100.0)	30	4,785	241.80	41.81
175～ (%)		1 (0.1)	2 (0.1)	11 (0.6)	6 (0.3)	41 (2.3)	321 (18.1)	277 (15.6)	573 (32.3)	102 (5.7)	95 (5.3)	280 (15.8)	47 (2.6)	20 (1.1)	1,776 (100.0)	10	1,786	249.16	43.54
180～ (%)				3 (0.6)	1 (0.2)	8 (1.6)	57 (11.6)	70 (14.3)	168 (34.3)	26 (5.3)	43 (8.8)	97 (19.8)	13 (2.7)	4 (0.8)	490 (100.0)	3	493	256.15	41.06
185～ (%)							8 (10.4)	10 (13.0)	29 (37.7)	4 (5.2)	6 (7.8)	18 (23.4)	1 (1.3)	1 (1.3)	77 (100.0)		77	260.13	37.71
190～ (%)				1 (11.1)			2 (22.2)	1 (11.1)	3 (33.3)			2 (22.2)			9 (100.0)		9	237.78	52.39
合計 (%)	1 (0.0)	34 (0.1)	80 (0.2)	1,205 (3.3)	530 (1.4)	2,713 (7.4)	12,475 (34.0)	6,188 (16.9)	8,539 (23.3)	1,027 (2.8)	970 (2.6)	2,359 (6.4)	329 (0.9)	194 (0.5)	36,644 (100.0)	251	36,895	224.71	40.50
記載なし (%)		3 (0.1)	14 (0.5)	137 (5.0)	48 (1.7)	233 (8.5)	1,072 (39.1)	419 (15.3)	588 (21.4)	51 (1.9)	50 (1.8)	106 (3.9)	16 (0.6)	8 (0.3)	2,745 (100.0)	306	3,051	217.06	37.70
総計 (%)	1 (0.0)	37 (0.1)	94 (0.2)	1,342 (3.4)	578 (1.5)	2,946 (7.5)	13,547 (34.4)	6,607 (16.8)	9,127 (23.2)	1,078 (2.7)	1,020 (2.6)	2,465 (6.3)	345 (0.9)	202 (0.5)	39,389 (100.0)	557	39,946	224.18	40.35
平均	143.00	154.71	153.04	152.98	153.42	155.54	158.57	161.74	163.62	164.89	165.69	165.90	167.58	166.03	160.74	160.10	160.74		
標準偏差		10.42	10.00	9.16	8.88	9.07	8.91	8.86	8.69	8.79	8.89	9.34	7.82	7.97	9.54	9.34	9.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査