

表 1988 血流量(ml/分) 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析後体重	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)							5 (41.7)		7 (58.3)						12 (100.0)		12	229.17	25.75
20～ (%)		2 (2.6)	2 (2.6)	17 (22.4)	6 (7.9)	17 (22.4)	22 (28.9)	4 (5.3)	4 (5.3)		1 (1.3)	1 (1.3)			76 (100.0)		76	182.63	36.75
30～ (%)	1 (0.0)	13 (0.5)	26 (1.0)	310 (11.6)	155 (5.8)	443 (16.6)	1,121 (42.1)	282 (10.6)	233 (8.7)	21 (0.8)	19 (0.7)	37 (1.4)	2 (0.1)	2 (0.1)	2,665 (100.0)	17	2,682	197.10	33.19
40～ (%)		5 (0.1)	32 (0.3)	551 (5.5)	220 (2.2)	1,141 (11.5)	4,341 (43.6)	1,531 (15.4)	1,562 (15.7)	134 (1.3)	119 (1.2)	274 (2.8)	25 (0.3)	21 (0.2)	9,956 (100.0)	49	10,005	210.81	34.15
50～ (%)		11 (0.1)	22 (0.2)	318 (2.6)	133 (1.1)	825 (6.6)	4,553 (36.6)	2,301 (18.5)	2,873 (23.1)	324 (2.6)	293 (2.4)	659 (5.3)	69 (0.6)	51 (0.4)	12,432 (100.0)	58	12,490	223.35	37.14
60～ (%)		3 (0.0)	7 (0.1)	94 (1.1)	43 (0.5)	375 (4.5)	2,257 (27.1)	1,543 (18.5)	2,476 (29.7)	334 (4.0)	300 (3.6)	735 (8.8)	101 (1.2)	57 (0.7)	8,325 (100.0)	40	8,365	235.17	40.00
70～ (%)		2 (0.1)	2 (0.1)	26 (0.8)	12 (0.4)	63 (1.8)	761 (22.3)	602 (17.7)	1,096 (32.2)	150 (4.4)	177 (5.2)	403 (11.8)	74 (2.2)	39 (1.1)	3,407 (100.0)	16	3,423	244.17	42.79
80～ (%)		1 (0.1)		5 (0.4)		19 (1.5)	205 (16.2)	205 (16.2)	445 (35.2)	66 (5.2)	64 (5.1)	191 (15.1)	43 (3.4)	21 (1.7)	1,265 (100.0)	8	1,273	252.58	44.36
90～ (%)				1 (0.2)		5 (1.1)	55 (12.1)	61 (13.4)	158 (34.8)	32 (7.0)	29 (6.4)	90 (19.8)	19 (4.2)	4 (0.9)	454 (100.0)	1	455	259.04	42.51
100～ (%)				2 (1.4)	1 (0.7)		15 (10.6)	20 (14.1)	50 (35.2)	10 (7.0)	6 (4.2)	29 (20.4)	7 (4.9)	2 (1.4)	142 (100.0)		142	259.40	44.74
110～ (%)				1 (1.7)		1 (1.7)	7 (11.7)	3 (5.0)	19 (31.7)	2 (3.3)	2 (3.3)	21 (35.0)	3 (5.0)	1 (1.7)	60 (100.0)	1	61	268.42	48.13
120～ (%)							2 (5.4)	1 (2.7)	11 (29.7)	4 (10.8)	3 (8.1)	13 (35.1)	1 (2.7)	2 (5.4)	37 (100.0)		37	280.81	43.49
合計 (%)	1 (0.0)	37 (0.1)	91 (0.2)	1,325 (3.4)	570 (1.5)	2,889 (7.4)	13,344 (34.4)	6,553 (16.9)	8,934 (23.0)	1,077 (2.8)	1,013 (2.6)	2,453 (6.3)	344 (0.9)	200 (0.5)	38,831 (100.0)	190	39,021	224.24	40.40
記載なし (%)			3 (0.5)	17 (3.0)	8 (1.4)	57 (10.2)	203 (36.4)	54 (9.7)	193 (34.6)	1 (0.2)	7 (1.3)	12 (2.2)	1 (0.2)	2 (0.4)	558 (100.0)	367	925	219.64	36.82
総計 (%)	1 (0.0)	37 (0.1)	94 (0.2)	1,342 (3.4)	578 (1.5)	2,946 (7.5)	13,547 (34.4)	6,607 (16.8)	9,127 (23.2)	1,078 (2.7)	1,020 (2.6)	2,465 (6.3)	345 (0.9)	202 (0.5)	39,389 (100.0)	557	39,946	224.18	40.35
平均	37.50	48.45	46.21	47.18	46.77	49.73	53.52	57.40	60.52	63.14	63.53	65.15	69.26	65.69	56.63	56.03	56.63		
標準偏差		13.10	10.32	10.29	9.95	10.16	11.13	11.88	13.01	13.66	13.63	14.98	14.91	14.62	13.03	13.07	13.03		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査