

表 1989 血流量(ml/分) 体重減少量(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.0未満 (%)				7 (7.3)	1 (1.0)	9 (9.4)	36 (37.5)	15 (15.6)	16 (16.7)	4 (4.2)	1 (1.0)	6 (6.3)	1 (1.0)		96 (100.0)	1	97	216.98	39.18
0.0～ (%)		6 (0.5)	8 (0.6)	99 (7.6)	29 (2.2)	146 (11.2)	498 (38.2)	161 (12.3)	231 (17.7)	45 (3.4)	25 (1.9)	46 (3.5)	5 (0.4)	6 (0.5)	1,305 (100.0)	15	1,320	212.60	40.09
1.0～ (%)		7 (0.1)	31 (0.4)	368 (5.0)	203 (2.8)	839 (11.4)	2,935 (40.0)	1,083 (14.7)	1,276 (17.4)	141 (1.9)	122 (1.7)	276 (3.8)	35 (0.5)	28 (0.4)	7,344 (100.0)	56	7,400	213.94	37.99
2.0～ (%)	1 (0.0)	10 (0.1)	22 (0.2)	359 (2.5)	209 (1.4)	1,063 (7.3)	5,349 (36.7)	2,679 (18.4)	3,250 (22.3)	353 (2.4)	331 (2.3)	783 (5.4)	104 (0.7)	70 (0.5)	14,583 (100.0)	71	14,654	223.05	38.27
3.0～ (%)		4 (0.1)	1 (0.0)	68 (0.9)	44 (0.6)	278 (3.5)	2,230 (27.9)	1,535 (19.2)	2,356 (29.5)	301 (3.8)	298 (3.7)	724 (9.1)	104 (1.3)	49 (0.6)	7,992 (100.0)	22	8,014	235.83	39.23
4.0～ (%)				8 (0.4)	7 (0.3)	33 (1.5)	366 (16.8)	374 (17.1)	770 (35.2)	112 (5.1)	122 (5.6)	314 (14.4)	57 (2.6)	22 (1.0)	2,185 (100.0)	6	2,191	249.60	40.86
5.0～ (%)						3 (0.8)	62 (15.5)	50 (12.5)	155 (38.8)	19 (4.8)	25 (6.3)	71 (17.8)	10 (2.5)	5 (1.3)	400 (100.0)		400	254.78	39.70
6.0～ (%)							5 (8.5)	10 (16.9)	19 (32.2)	5 (8.5)	6 (10.2)	13 (22.0)		1 (1.7)	59 (100.0)		59	262.71	46.23
7.0～ (%)							4 (25.0)	2 (12.5)	5 (31.3)		1 (6.3)	3 (18.8)		1 (6.3)	16 (100.0)		16	255.63	55.49
8.0～ (%)						6 (20.0)	8 (26.7)	3 (10.0)	10 (33.3)	1 (3.3)	1 (3.3)	1 (3.3)			30 (100.0)		30	222.67	33.62
合計 (%)	1 (0.0)	27 (0.1)	62 (0.2)	909 (2.7)	493 (1.4)	2,377 (7.0)	11,493 (33.8)	5,912 (17.4)	8,088 (23.8)	981 (2.9)	932 (2.7)	2,237 (6.6)	316 (0.9)	182 (0.5)	34,010 (100.0)	171	34,181	225.83	40.15
記載なし (%)			1 (0.2)	15 (2.9)	7 (1.4)	46 (9.0)	181 (35.4)	53 (10.4)	182 (35.6)	1 (0.2)	8 (1.6)	14 (2.7)	2 (0.4)	1 (0.2)	511 (100.0)	279	790	221.68	35.67
総計 (%)	1 (0.0)	27 (0.1)	63 (0.2)	924 (2.7)	500 (1.4)	2,423 (7.0)	11,674 (33.8)	5,965 (17.3)	8,270 (24.0)	982 (2.8)	940 (2.7)	2,251 (6.5)	318 (0.9)	183 (0.5)	34,521 (100.0)	450	34,971	225.77	40.09
平均	2.30	1.91	1.68	1.89	2.03	2.16	2.38	2.64	2.80	2.82	2.97	3.02	3.11	2.87	2.57	2.12	2.57		
標準偏差		1.01	0.62	0.78	0.73	1.11	0.92	0.94	1.07	1.12	1.06	1.10	1.05	1.13	1.03	0.96	1.03		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査