表 1998　血流量(ml/分)　透析前アルブミン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前アルブミン濃度	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満				1		2	6					1			10		10	201.00	38.43
（%）				(10.0)		(20.0)	(60.0)					(10.0)			(100.0)				
1.5～		1	2	18	2	7	20	4	3	2		1			60	2	62	185.08	38.83
（%）		(1.7)	(3.3)	(30.0)	(3.3)	(11.7)	(33.3)	(6.7)	(5.0)	(3.3)		(1.7)			(100.0)				
2.0～		4	7	41	12	42	133	24	18	4	2	7			294		294	194.49	35.45
（%）		(1.4)	(2.4)	(13.9)	(4.1)	(14.3)	(45.2)	(8.2)	(6.1)	(1.4)	(0.7)	(2.4)			(100.0)				
2.5～		7	10	139	39	190	546	160	199	20	23	42	2	2	1,379	13	1,392	205.76	37.34
（%）		(0.5)	(0.7)	(10.1)	(2.8)	(13.8)	(39.6)	(11.6)	(14.4)	(1.5)	(1.7)	(3.0)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
3.0～	1	5	27	429	184	819	3,167	1,315	1,795	186	188	522	62	31	8,731	76	8,807	219.43	40.19
（%）	(0.0)	(0.1)	(0.3)	(4.9)	(2.1)	(9.4)	(36.3)	(15.1)	(20.6)	(2.1)	(2.2)	(6.0)	(0.7)	(0.4)	(100.0)				
3.5～		15	40	542	265	1,368	6,983	3,555	4,886	603	542	1,336	193	119	20,447	138	20,585	226.08	40.26
（%）		(0.1)	(0.2)	(2.7)	(1.3)	(6.7)	(34.2)	(17.4)	(23.9)	(2.9)	(2.7)	(6.5)	(0.9)	(0.6)	(100.0)				
4.0～		4	5	133	61	399	2,260	1,330	1,847	228	232	494	75	44	7,112	46	7,158	229.64	39.61
（%）		(0.1)	(0.1)	(1.9)	(0.9)	(5.6)	(31.8)	(18.7)	(26.0)	(3.2)	(3.3)	(6.9)	(1.1)	(0.6)	(100.0)				
4.5～				5		18	86	63	90	9	11	27	3	2	314	3	317	233.01	38.70
（%）				(1.6)		(5.7)	(27.4)	(20.1)	(28.7)	(2.9)	(3.5)	(8.6)	(1.0)	(0.6)	(100.0)				
5.0～						3	4	5	2	1	2	1			18		18	226.67	36.62
（%）						(16.7)	(22.2)	(27.8)	(11.1)	(5.6)	(11.1)	(5.6)			(100.0)				
合計	1	36	91	1,308	563	2,848	13,205	6,456	8,840	1,053	1,000	2,431	335	198	38,365	278	38,643	224.24	40.40
（%）	(0.0)	(0.1)	(0.2)	(3.4)	(1.5)	(7.4)	(34.4)	(16.8)	(23.0)	(2.7)	(2.6)	(6.3)	(0.9)	(0.5)	(100.0)				
記載なし		1	3	34	15	98	342	151	287	25	20	34	10	4	1,024	279	1,303	221.90	38.68
（%）		(0.1)	(0.3)	(3.3)	(1.5)	(9.6)	(33.4)	(14.7)	(28.0)	(2.4)	(2.0)	(3.3)	(1.0)	(0.4)	(100.0)				
総計	1	37	94	1,342	578	2,946	13,547	6,607	9,127	1,078	1,020	2,465	345	202	39,389	557	39,946	224.18	40.35
（%）	(0.0)	(0.1)	(0.2)	(3.4)	(1.5)	(7.5)	(34.4)	(16.8)	(23.2)	(2.7)	(2.6)	(6.3)	(0.9)	(0.5)	(100.0)				
平均	3.40	3.26	3.29	3.41	3.48	3.54	3.61	3.68	3.69	3.70	3.71	3.69	3.71	3.72	3.64	3.60	3.64		
標準偏差		0.64	0.53	0.49	0.43	0.43	0.39	0.36	0.35	0.36	0.36	0.35	0.31	0.31	0.39	0.42	0.39		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査