

表 2000 血流量(ml/分) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前補正 カルシウム濃度	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)		1 (0.6)		4 (2.5)	2 (1.3)	17 (10.6)	65 (40.6)	22 (13.8)	32 (20.0)	1 (0.6)	3 (1.9)	11 (6.9)	1 (0.6)	1 (0.6)	160 (100.0)		160	220.53	41.74
7.0～ (%)		1 (0.4)	1 (0.4)	12 (4.7)	3 (1.2)	13 (5.1)	88 (34.2)	45 (17.5)	62 (24.1)	11 (4.3)	6 (2.3)	13 (5.1)	1 (0.4)	1 (0.4)	257 (100.0)	2	259	222.70	38.22
7.5～ (%)			3 (0.3)	30 (3.2)	15 (1.6)	62 (6.6)	334 (35.6)	151 (16.1)	201 (21.5)	28 (3.0)	35 (3.7)	65 (6.9)	11 (1.2)	2 (0.2)	937 (100.0)	14	951	225.06	39.99
8.0～ (%)		3 (0.1)	8 (0.3)	85 (3.0)	44 (1.5)	189 (6.6)	1,032 (36.3)	451 (15.9)	675 (23.7)	72 (2.5)	67 (2.4)	184 (6.5)	27 (0.9)	7 (0.2)	2,844 (100.0)	24	2,868	224.02	38.85
8.4～ (%)		1 (0.1)	2 (0.2)	25 (3.1)	12 (1.5)	66 (8.1)	263 (32.4)	139 (17.1)	179 (22.0)	19 (2.3)	29 (3.6)	64 (7.9)	4 (0.5)	9 (1.1)	812 (100.0)	6	818	226.53	43.14
8.5～ (%)		3 (0.0)	15 (0.2)	310 (3.4)	128 (1.4)	628 (6.8)	3,143 (34.1)	1,552 (16.8)	2,200 (23.9)	268 (2.9)	232 (2.5)	608 (6.6)	87 (0.9)	40 (0.4)	9,214 (100.0)	87	9,301	225.24	40.13
9.0～ (%)	1 (0.0)	13 (0.1)	24 (0.2)	389 (3.4)	147 (1.3)	829 (7.3)	3,904 (34.2)	2,004 (17.5)	2,587 (22.6)	331 (2.9)	305 (2.7)	717 (6.3)	104 (0.9)	74 (0.6)	11,429 (100.0)	86	11,515	224.67	40.84
9.5～ (%)		7 (0.1)	20 (0.3)	259 (3.4)	107 (1.4)	587 (7.7)	2,537 (33.5)	1,266 (16.7)	1,796 (23.7)	213 (2.8)	196 (2.6)	487 (6.4)	63 (0.8)	41 (0.5)	7,579 (100.0)	33	7,612	224.52	40.60
10.0～ (%)		3 (0.3)	2 (0.2)	35 (3.9)	19 (2.1)	85 (9.4)	297 (33.0)	154 (17.1)	190 (21.1)	27 (3.0)	25 (2.8)	50 (5.5)	10 (1.1)	4 (0.4)	901 (100.0)	2	903	222.24	41.32
10.1～ (%)		4 (0.2)	7 (0.3)	85 (3.5)	45 (1.8)	209 (8.6)	845 (34.7)	416 (17.1)	538 (22.1)	55 (2.3)	60 (2.5)	143 (5.9)	15 (0.6)	14 (0.6)	2,436 (100.0)	16	2,452	222.12	40.39
10.5～ (%)			7 (0.6)	42 (3.6)	27 (2.3)	95 (8.2)	445 (38.3)	188 (16.2)	240 (20.6)	21 (1.8)	25 (2.1)	61 (5.2)	10 (0.9)	2 (0.2)	1,163 (100.0)	7	1,170	219.47	38.48
11.0～ (%)			1 (0.3)	14 (3.7)	9 (2.3)	36 (9.4)	153 (39.9)	44 (11.5)	89 (23.2)	5 (1.3)	10 (2.6)	18 (4.7)	1 (0.3)	3 (0.8)	383 (100.0)		383	219.01	38.93
11.5～ (%)			1 (0.8)	9 (6.8)	2 (1.5)	16 (12.1)	53 (40.2)	16 (12.1)	24 (18.2)	1 (0.8)	4 (3.0)	5 (3.8)	1 (0.8)		132 (100.0)		132	212.73	37.86
12.0～ (%)				5 (7.1)	3 (4.3)	15 (21.4)	25 (35.7)	1 (1.4)	15 (21.4)	1 (1.4)	1 (1.4)	4 (5.7)			70 (100.0)	1	71	209.29	39.06
合計 (%)	1 (0.0)	36 (0.1)	91 (0.2)	1,304 (3.4)	563 (1.5)	2,847 (7.4)	13,184 (34.4)	6,449 (16.8)	8,828 (23.0)	1,053 (2.7)	998 (2.6)	2,430 (6.3)	335 (0.9)	198 (0.5)	38,317 (100.0)	278	38,595	224.25	40.40
記載なし (%)			1 (0.1)	3 (0.3)	38 (3.5)	15 (1.4)	99 (9.2)	363 (33.9)	158 (14.7)	299 (23.9)	25 (2.3)	35 (3.3)	10 (0.9)	4 (0.4)	1,072 (100.0)	279	1,351	221.71	38.58
総計 (%)	1 (0.0)	37 (0.1)	94 (0.2)	1,342 (3.4)	578 (1.5)	2,946 (7.5)	13,547 (34.4)	6,607 (16.8)	9,127 (23.2)	1,078 (2.7)	1,020 (2.6)	2,465 (6.3)	345 (0.9)	202 (0.5)	39,389 (100.0)	557	39,946	224.18	40.35
平均	9.40	9.15	9.32	9.23	9.25	9.25	9.19	9.18	9.18	9.14	9.17	9.16	9.15	9.24	9.19	9.03	9.19		
標準偏差		0.98	0.85	0.76	0.82	0.80	0.77	0.70	0.73	0.68	0.72	0.72	0.70	0.64	0.75	0.69	0.75		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査