

表 2001 血流量(ml/分) 透析前リン濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前リン濃度	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3未満 (%)		2 (0.2)	10 (0.9)	84 (7.5)	29 (2.6)	139 (12.3)	414 (36.7)	141 (12.5)	199 (17.7)	22 (2.0)	18 (1.6)	58 (5.1)	8 (0.7)	3 (0.3)	1,127 (100.0)	6	1,133	213.25	41.29
3.0～ (%)		2 (0.1)	4 (0.3)	106 (6.8)	37 (2.4)	128 (8.2)	588 (37.7)	228 (14.6)	294 (18.8)	34 (2.2)	41 (2.6)	84 (5.4)	7 (0.4)	7 (0.4)	1,560 (100.0)	14	1,574	217.21	40.85
3.5～ (%)		4 (0.1)	11 (0.4)	149 (5.3)	48 (1.7)	271 (9.6)	1,022 (36.1)	426 (15.1)	585 (20.7)	61 (2.2)	60 (2.1)	141 (5.0)	34 (1.2)	17 (0.6)	2,829 (100.0)	20	2,849	219.54	41.75
4.0～ (%)		2 (0.0)	13 (0.3)	168 (3.7)	89 (2.0)	367 (8.1)	1,627 (35.9)	717 (15.8)	975 (21.5)	110 (2.4)	113 (2.5)	275 (6.1)	46 (1.0)	30 (0.7)	4,532 (100.0)	33	4,565	222.78	41.64
4.5～ (%)		4 (0.1)	12 (0.2)	173 (3.1)	80 (1.4)	436 (7.7)	1,965 (34.7)	961 (17.0)	1,289 (22.7)	163 (2.9)	136 (2.4)	349 (6.2)	59 (1.0)	41 (0.7)	5,668 (100.0)	44	5,712	224.78	41.17
5.0～ (%)		3 (0.0)	12 (0.2)	179 (2.9)	81 (1.3)	420 (6.9)	2,061 (33.9)	1,078 (17.7)	1,440 (23.7)	168 (2.8)	171 (2.8)	397 (6.5)	47 (0.8)	30 (0.5)	6,087 (100.0)	47	6,134	225.32	39.60
5.5～ (%)		6 (0.1)	8 (0.2)	135 (2.6)	63 (1.2)	348 (6.6)	1,788 (34.0)	928 (17.6)	1,265 (24.0)	174 (3.3)	135 (2.6)	347 (6.6)	40 (0.8)	25 (0.5)	5,262 (100.0)	37	5,299	226.04	39.53
6.0～ (%)		1 (0.1)	1 (0.1)	17 (1.8)	16 (1.7)	72 (7.6)	336 (35.4)	149 (15.7)	228 (24.1)	30 (3.2)	36 (3.8)	53 (5.6)	4 (0.4)	5 (0.5)	948 (100.0)	2	950	225.21	38.04
6.1～ (%)		4 (0.1)	2 (0.1)	102 (3.2)	37 (1.1)	230 (7.1)	1,089 (33.8)	548 (17.0)	766 (23.8)	97 (3.0)	91 (2.8)	215 (6.7)	25 (0.8)	14 (0.4)	3,220 (100.0)	24	3,244	225.43	39.68
6.5～ (%)		2 (0.1)	4 (0.1)	83 (3.0)	32 (1.1)	166 (6.0)	972 (34.9)	500 (17.9)	670 (24.0)	76 (2.7)	66 (2.4)	187 (6.7)	23 (0.8)	7 (0.3)	2,788 (100.0)	18	2,806	225.28	38.23
7.0～ (%)		3 (0.2)	6 (0.3)	47 (2.7)	23 (1.3)	105 (6.0)	563 (32.0)	321 (18.2)	448 (25.4)	52 (3.0)	45 (2.6)	122 (6.9)	19 (1.1)	7 (0.4)	1,761 (100.0)	14	1,775	227.03	39.98
7.5～ (%)			2 (0.2)	24 (2.2)	19 (1.7)	72 (6.6)	341 (31.0)	215 (19.6)	272 (24.7)	28 (2.5)	32 (2.9)	78 (7.1)	10 (0.9)	6 (0.5)	1,099 (100.0)	5	1,104	227.67	39.92
8.0～ (%)		1 (0.2)		15 (2.3)	4 (0.6)	46 (7.1)	193 (29.9)	122 (18.9)	175 (27.1)	12 (1.9)	31 (4.8)	39 (6.0)	5 (0.8)	3 (0.5)	646 (100.0)	5	651	228.52	38.63
8.5～ (%)			1 (0.2)	14 (3.4)	4 (1.0)	14 (3.4)	136 (32.6)	79 (18.9)	105 (25.2)	10 (2.4)	15 (3.6)	36 (8.6)	2 (0.5)	1 (0.2)	417 (100.0)	6	423	228.48	38.10
9.0～ (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	3 (0.4)	16 (2.4)	4 (0.6)	50 (7.4)	211 (31.1)	106 (15.6)	179 (26.4)	28 (4.1)	15 (2.2)	53 (7.8)	9 (1.3)	2 (0.3)	678 (100.0)	4	682	228.50	40.94
合計 (%)	1 (0.0)	35 (0.1)	89 (0.2)	1,312 (3.4)	566 (1.5)	2,864 (7.4)	13,306 (34.5)	6,519 (16.9)	8,890 (23.0)	1,065 (2.8)	1,005 (2.6)	2,434 (6.3)	338 (0.9)	198 (0.5)	38,622 (100.0)	279	38,901	224.23	40.33
記載なし (%)		2 (0.3)	5 (0.7)	30 (3.9)	12 (1.6)	82 (10.7)	241 (31.4)	88 (11.5)	237 (30.9)	13 (1.7)	15 (2.0)	31 (4.0)	7 (0.9)	4 (0.5)	767 (100.0)	278	1,045	221.63	41.30
総計 (%)	1 (0.0)	37 (0.1)	94 (0.2)	1,342 (3.4)	578 (1.5)	2,946 (7.5)	13,547 (34.4)	6,607 (16.8)	9,127 (23.2)	1,078 (2.7)	1,020 (2.6)	2,465 (6.3)	345 (0.9)	202 (0.5)	39,389 (100.0)	557	39,946	224.18	40.35
平均	9.20	5.31	4.89	4.97	5.05	5.17	5.30	5.44	5.46	5.48	5.48	5.48	5.38	5.17	5.36	5.35	5.36		
標準偏差		1.56	1.77	1.52	1.41	1.45	1.41	1.40	1.41	1.41	1.40	1.44	1.56	1.25	1.43	1.41	1.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査