

表 2004 血流量(ml/分) 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前ヘモグロビン濃度	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5未満 (%)						2 (7.7)	9 (34.6)	4 (15.4)	6 (23.1)		1 (3.8)	4 (15.4)			26 (100.0)		26	231.54	38.54
5～ (%)			1 (3.2)		2 (6.5)	2 (6.5)	11 (35.5)	6 (19.4)	9 (29.0)						31 (100.0)		31	212.26	30.74
6～ (%)		1 (0.9)	2 (1.8)	10 (8.8)	2 (1.8)	11 (9.6)	45 (39.5)	17 (14.9)	21 (18.4)	1 (0.9)	2 (1.8)	2 (1.8)			114 (100.0)		114	207.28	35.83
7～ (%)		5 (1.1)	6 (1.4)	47 (10.7)	18 (4.1)	50 (11.3)	171 (38.8)	47 (10.7)	71 (16.1)	4 (0.9)	10 (2.3)	11 (2.5)	1 (0.2)		441 (100.0)	4	445	204.63	38.65
8～ (%)		7 (0.4)	13 (0.8)	109 (6.7)	33 (2.0)	183 (11.3)	636 (39.3)	227 (14.0)	277 (17.1)	30 (1.9)	27 (1.7)	67 (4.1)	6 (0.4)	4 (0.2)	1,619 (100.0)	18	1,637	212.20	39.19
9～ (%)		6 (0.1)	18 (0.3)	273 (4.7)	137 (2.4)	519 (8.9)	2,158 (37.2)	984 (17.0)	1,130 (19.5)	138 (2.4)	126 (2.2)	260 (4.5)	32 (0.6)	18 (0.3)	5,799 (100.0)	51	5,850	217.67	38.07
10～ (%)	1 (0.0)	11 (0.1)	22 (0.2)	383 (3.0)	175 (1.4)	933 (7.2)	4,482 (34.8)	2,185 (17.0)	3,057 (23.8)	375 (2.9)	297 (2.3)	783 (6.1)	108 (0.8)	57 (0.4)	12,869 (100.0)	78	12,947	224.38	39.16
11～ (%)		3 (0.0)	23 (0.2)	325 (2.8)	139 (1.2)	794 (6.9)	3,785 (32.9)	1,951 (17.0)	2,778 (24.1)	362 (3.1)	337 (2.9)	824 (7.2)	111 (1.0)	73 (0.6)	11,505 (100.0)	72	11,577	227.18	41.19
12～ (%)		2 (0.0)	5 (0.1)	126 (2.9)	43 (1.0)	270 (6.2)	1,403 (32.3)	772 (17.7)	1,059 (24.3)	110 (2.5)	145 (3.3)	337 (7.7)	50 (1.1)	28 (0.6)	4,350 (100.0)	32	4,382	228.52	41.46
13～ (%)				20 (1.7)	13 (1.1)	58 (4.9)	375 (31.9)	218 (18.6)	312 (26.6)	30 (2.6)	36 (3.1)	86 (7.3)	18 (1.5)	8 (0.7)	1,174 (100.0)	11	1,185	230.86	39.81
14～ (%)			1 (0.2)	13 (2.5)	5 (1.0)	19 (3.7)	158 (30.4)	75 (14.5)	155 (29.9)	10 (1.9)	11 (2.1)	51 (9.8)	11 (2.1)	10 (1.9)	519 (100.0)	4	523	236.60	49.01
合計 (%)	1 (0.0)	35 (0.1)	91 (0.2)	1,306 (3.4)	567 (1.5)	2,841 (7.4)	13,233 (34.4)	6,486 (16.9)	8,875 (23.1)	1,060 (2.8)	992 (2.6)	2,425 (6.3)	337 (0.9)	198 (0.5)	38,447 (100.0)	270	38,717	224.24	40.35
記載なし (%)		2 (0.2)	3 (0.3)	36 (3.8)	11 (1.2)	105 (11.1)	314 (33.3)	121 (12.8)	252 (26.8)	18 (1.9)	28 (3.0)	40 (4.2)	8 (0.8)	4 (0.4)	942 (100.0)	287	1,229	221.60	40.44
総計 (%)	1 (0.0)	37 (0.1)	94 (0.2)	1,342 (3.4)	578 (1.5)	2,946 (7.5)	13,547 (34.4)	6,607 (16.8)	9,127 (23.2)	1,078 (2.7)	1,020 (2.6)	2,465 (6.3)	345 (0.9)	202 (0.5)	39,389 (100.0)	557	39,946	224.18	40.35
平均	10.10	9.53	10.03	10.48	10.48	10.62	10.77	10.88	10.96	10.91	11.01	11.08	11.25	11.35	10.84	10.78	10.84		
標準偏差		1.46	1.60	1.37	1.34	1.25	1.27	1.22	1.25	1.09	1.19	1.25	1.25	1.27	1.26	1.30	1.26		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査