

表 2008 血流量(ml/分) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮期血圧	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)						1 (50.0)	1 (50.0)								2 (100.0)		2	190.00	14.14
60～ (%)				14 (12.4)	4 (3.5)	17 (15.0)	44 (38.9)	15 (13.3)	13 (11.5)	4 (3.5)	1 (0.9)	1 (0.9)			113 (100.0)	2	115	202.21	32.86
80～ (%)		1 (0.2)	6 (1.0)	52 (8.5)	19 (3.1)	65 (10.6)	253 (41.3)	73 (11.9)	99 (16.2)	11 (1.8)	9 (1.5)	24 (3.9)	1 (0.2)		613 (100.0)	2	615	209.00	36.94
100～ (%)		9 (0.3)	14 (0.5)	143 (5.1)	51 (1.8)	294 (10.6)	1,029 (36.9)	434 (15.6)	526 (18.9)	78 (2.8)	66 (2.4)	119 (4.3)	15 (0.5)	7 (0.3)	2,785 (100.0)	15	2,800	216.56	38.97
120～ (%)		4 (0.1)	23 (0.3)	265 (3.5)	157 (2.1)	567 (7.5)	2,665 (35.1)	1,301 (17.1)	1,687 (22.2)	215 (2.8)	217 (2.9)	410 (5.4)	56 (0.7)	29 (0.4)	7,596 (100.0)	43	7,639	222.39	39.18
140～ (%)	1 (0.0)	11 (0.1)	25 (0.2)	361 (3.2)	143 (1.3)	795 (7.0)	3,684 (32.4)	1,987 (17.4)	2,790 (24.5)	364 (3.2)	327 (2.9)	743 (6.5)	110 (1.0)	46 (0.4)	11,387 (100.0)	46	11,433	225.94	39.84
160～ (%)		5 (0.1)	14 (0.2)	226 (2.7)	99 (1.2)	601 (7.3)	2,757 (33.3)	1,387 (16.8)	2,059 (24.9)	185 (2.2)	219 (2.6)	603 (7.3)	84 (1.0)	35 (0.4)	8,274 (100.0)	34	8,308	226.34	40.00
180～ (%)			6 (0.2)	114 (3.6)	28 (0.9)	207 (6.6)	1,118 (35.5)	528 (16.8)	723 (23.0)	90 (2.9)	72 (2.3)	222 (7.0)	21 (0.7)	20 (0.6)	3,149 (100.0)	5	3,154	225.04	39.91
200～ (%)		2 (0.2)	2 (0.2)	31 (3.8)	10 (1.2)	74 (9.0)	255 (31.1)	131 (16.0)	203 (24.8)	17 (2.1)	19 (2.3)	61 (7.4)	9 (1.1)	5 (0.6)	819 (100.0)	3	822	225.05	41.96
220～ (%)				9 (4.2)	4 (1.9)	16 (7.4)	57 (26.4)	52 (24.1)	43 (19.9)	9 (4.2)	5 (2.3)	16 (7.4)	4 (1.9)	1 (0.5)	216 (100.0)		216	228.08	42.04
合計 (%)	1 (0.0)	32 (0.1)	90 (0.3)	1,215 (3.5)	515 (1.5)	2,637 (7.5)	11,863 (33.9)	5,908 (16.9)	8,143 (23.3)	973 (2.8)	935 (2.7)	2,199 (6.3)	300 (0.9)	143 (0.4)	34,954 (100.0)	150	35,104	224.05	39.83
記載なし (%)		5 (0.1)	4 (0.1)	127 (2.9)	63 (1.4)	309 (7.0)	1,684 (38.0)	699 (15.8)	984 (22.2)	105 (2.4)	85 (1.9)	266 (6.0)	45 (1.0)	59 (1.3)	4,435 (100.0)	407	4,842	225.18	44.27
総計 (%)	1 (0.0)	37 (0.1)	94 (0.2)	1,342 (3.4)	578 (1.5)	2,946 (7.5)	13,547 (34.4)	6,607 (16.8)	9,127 (23.2)	1,078 (2.7)	1,020 (2.6)	2,465 (6.3)	345 (0.9)	202 (0.5)	39,389 (100.0)	557	39,946	224.18	40.35
平均	145.00	140.78	140.48	146.32	144.07	148.33	149.81	151.36	152.27	150.06	150.62	154.57	154.52	156.52	150.69	144.95	150.67		
標準偏差		28.26	26.91	28.54	26.25	26.73	25.47	24.59	23.77	24.52	23.28	23.76	24.11	23.11	25.04	24.64	25.04		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査