

表 2009 血流量(ml/分) 透析前拡張期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)						1 (14.3)	2 (28.6)	2 (28.6)	1 (14.3)			1 (14.3)			7 (100.0)		7	224.29	39.94
20～ (%)			3 (2.5)	12 (10.2)	8 (6.8)	14 (11.9)	47 (39.8)	16 (13.6)	13 (11.0)		1 (0.8)	3 (2.5)	1 (0.8)		118 (100.0)	3	121	201.19	37.40
40～ (%)		7 (0.3)	16 (0.6)	194 (7.3)	76 (2.9)	327 (12.3)	1,039 (39.0)	360 (13.5)	454 (17.0)	57 (2.1)	38 (1.4)	86 (3.2)	7 (0.3)	5 (0.2)	2,666 (100.0)	14	2,680	210.42	37.26
60～ (%)	1 (0.0)	12 (0.1)	47 (0.3)	599 (4.0)	260 (1.7)	1,283 (8.6)	5,516 (37.0)	2,475 (16.6)	3,127 (21.0)	369 (2.5)	356 (2.4)	716 (4.8)	97 (0.7)	43 (0.3)	14,901 (100.0)	71	14,972	219.70	38.18
80～ (%)		9 (0.1)	13 (0.1)	243 (2.7)	99 (1.1)	604 (6.7)	2,919 (32.5)	1,545 (17.2)	2,261 (25.2)	266 (3.0)	264 (2.9)	620 (6.9)	90 (1.0)	38 (0.4)	8,971 (100.0)	32	9,003	227.06	39.82
90～ (%)		3 (0.1)	8 (0.2)	93 (1.8)	49 (0.9)	258 (4.9)	1,563 (29.5)	1,000 (18.9)	1,414 (26.7)	184 (3.5)	160 (3.0)	476 (9.0)	56 (1.1)	32 (0.6)	5,296 (100.0)	21	5,317	232.15	40.26
100～ (%)		1 (0.0)	2 (0.1)	66 (2.4)	21 (0.8)	136 (5.0)	703 (26.1)	465 (17.3)	777 (28.8)	85 (3.2)	102 (3.8)	272 (10.1)	42 (1.6)	22 (0.8)	2,694 (100.0)	7	2,701	235.25	42.31
120～ (%)				6 (3.6)	1 (0.6)	10 (6.0)	28 (16.8)	29 (17.4)	42 (25.1)	8 (4.8)	11 (6.6)	22 (13.2)	7 (4.2)	3 (1.8)	167 (100.0)	2	169	245.15	50.11
140～ (%)							4 (33.3)	2 (16.7)	3 (25.0)		1 (8.3)	2 (16.7)			12 (100.0)		12	240.00	38.14
合計 (%)	1 (0.0)	32 (0.1)	89 (0.3)	1,213 (3.5)	514 (1.5)	2,633 (7.6)	11,821 (33.9)	5,894 (16.9)	8,092 (23.2)	969 (2.8)	933 (2.7)	2,198 (6.3)	300 (0.9)	143 (0.4)	34,832 (100.0)	150	34,982	224.05	39.86
記載なし (%)		5 (0.1)	5 (0.1)	129 (2.8)	64 (1.4)	313 (6.9)	1,726 (37.9)	713 (15.6)	1,035 (22.7)	109 (2.4)	87 (1.9)	267 (5.9)	45 (1.0)	59 (1.3)	4,557 (100.0)	407	4,964	225.19	43.94
総計 (%)	1 (0.0)	37 (0.1)	94 (0.2)	1,342 (3.4)	578 (1.5)	2,946 (7.5)	13,547 (34.4)	6,607 (16.8)	9,127 (23.2)	1,078 (2.7)	1,020 (2.6)	2,465 (6.3)	345 (0.9)	202 (0.5)	39,389 (100.0)	557	39,946	224.18	40.35
平均	73.00	74.47	70.26	73.43	73.22	75.13	77.43	80.17	81.35	81.40	82.59	84.11	85.36	86.10	79.18	76.81	79.17		
標準偏差		15.21	15.57	15.72	14.99	14.53	14.25	14.37	14.32	14.33	14.79	14.69	14.86	14.56	14.70	15.89	14.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査