

表 2013 HDF希釈方法 治療方法(新分類)別(オフラインHDF 透析回数週3回)

治療方法 (新分類)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)								
Off-line HDF (%)	634 (13.1)	4,194 (86.7)	5 (0.1)	5 (0.1)	4,838 (100.0)		990	5,828
On-line HDF (%)								
Push/Pull HDF (%)								
ハイオフィльтраーション (%)								
血液濾過 (%)								
血液吸着透析 (リクセル) (%)								
血液吸着透析 (その他) (%)								
在宅血液透析 (%)								
腹膜透析 (CAPD) (%)								
腹膜透析 (APD) (%)								
腹膜透析 (CCPD) (%)								
合計 (%)	634 (13.1)	4,194 (86.7)	5 (0.1)	5 (0.1)	4,838 (100.0)		990	5,828
記載なし (%)								
総計 (%)	634 (13.1)	4,194 (86.7)	5 (0.1)	5 (0.1)	4,838 (100.0)		990	5,828

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査