

表 2016 HDF希釈方法 透析歴(年)別 (オフラインHDF 透析回数週3回)

透析歴	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	69 (18.0)	313 (81.7)		1 (0.3)	383 (100.0)		123	506
2年～ (%)	102 (13.2)	666 (86.4)	2 (0.3)	1 (0.1)	771 (100.0)		160	931
5年～ (%)	149 (13.1)	990 (86.8)		2 (0.2)	1,141 (100.0)		238	1,379
10年～ (%)	106 (13.1)	705 (86.8)		1 (0.1)	812 (100.0)		153	965
15年～ (%)	67 (11.8)	498 (87.8)	2 (0.4)		567 (100.0)		102	669
20年～ (%)	54 (12.8)	366 (86.9)	1 (0.2)		421 (100.0)		72	493
25年～ (%)	40 (12.0)	294 (88.0)			334 (100.0)		58	392
30年～ (%)	27 (11.0)	218 (89.0)			245 (100.0)		50	295
35年～ (%)	18 (13.3)	117 (86.7)			135 (100.0)		24	159
40年～ (%)	2 (7.4)	25 (92.6)			27 (100.0)		10	37
合計 (%)	634 (13.1)	4,192 (86.7)	5 (0.1)	5 (0.1)	4,836 (100.0)		990	5,826
不明 (%)		2 (100.0)			2 (100.0)			2
記載なし (%)								
総計 (%)	634 (13.1)	4,194 (86.7)	5 (0.1)	5 (0.1)	4,838 (100.0)		990	5,828
平均	12.02	12.85	12.40	6.40	12.74		11.83	12.58
標準偏差	9.75	9.95	8.44	5.18	9.93		10.15	9.97

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査