

表 2023 HDF希釈方法 大腿骨頸部骨折の既往別（オンラインHDF 透析回数週3回）

| 大腿骨頸部骨折 の既往 | 前希釈 | 後希釈 | 前・後希釈 | その他 | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|------------------|----|----------------|------------------|
| 既往なし (%) | 506 (94.6) | 3,360 (94.9) | 4 (80.0) | 3 (75.0) | 3,873 (94.8) | | 661 (95.2) | 4,534 (94.9) |
| 既往あり (%) | 29 (5.4) | 182 (5.1) | 1 (20.0) | 1 (25.0) | 213 (5.2) | | 33 (4.8) | 246 (5.1) |
| 合計 (%) | 535 (100.0) | 3,542 (100.0) | 5 (100.0) | 4 (100.0) | 4,086 (100.0) | | 694 (100.0) | 4,780 (100.0) |
| 不明 | 2 | 3 | | | 5 | | 1 | 6 |
| 記載なし | 97 | 649 | | 1 | 747 | | 295 | 1,042 |
| 総計 | 634 | 4,194 | 5 | 5 | 4,838 | | 990 | 5,828 |

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査