

表 2032 HDF希釈方法 体重減少率(%)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	13 (17.8)	60 (82.2)			73 (100.0)		22	95
1.0～ (%)	22 (15.4)	121 (84.6)			143 (100.0)		32	175
2.0～ (%)	65 (16.6)	326 (83.4)			391 (100.0)		70	461
3.0～ (%)	118 (13.4)	760 (86.5)		1 (0.1)	879 (100.0)		161	1,040
4.0～ (%)	152 (12.9)	1,021 (86.8)	1 (0.1)	2 (0.2)	1,176 (100.0)		217	1,393
5.0～ (%)	98 (10.3)	850 (89.5)	2 (0.2)		950 (100.0)		171	1,121
6.0～ (%)	59 (11.8)	438 (87.6)	2 (0.4)	1 (0.2)	500 (100.0)		100	600
7.0～ (%)	28 (15.9)	148 (84.1)			176 (100.0)		33	209
8.0～ (%)	4 (6.0)	63 (94.0)			67 (100.0)		14	81
9.0～ (%)		25 (100.0)			25 (100.0)		8	33
合計 (%)	559 (12.8)	3,812 (87.0)	5 (0.1)	4 (0.1)	4,380 (100.0)		828	5,208
記載なし (%)	6 (8.2)	67 (91.8)			73 (100.0)		39	112
総計 (%)	565 (12.7)	3,879 (87.1)	5 (0.1)	4 (0.1)	4,453 (100.0)		867	5,320
平均	4.42	4.64	5.68	4.81	4.61		4.60	4.61
標準偏差	1.58	1.59	1.04	1.22	1.59		1.70	1.61

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査