

表 2035 HDF希釈方法 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前クレアチニン 濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)								
2～ (%)	5 (16.7)	25 (83.3)			30 (100.0)		6	36
4～ (%)	20 (11.2)	158 (88.8)			178 (100.0)		36	214
6～ (%)	70 (11.9)	516 (88.1)			586 (100.0)		114	700
8～ (%)	164 (13.2)	1,078 (86.7)	1 (0.1)	1 (0.1)	1,244 (100.0)		244	1,488
10～ (%)	150 (12.3)	1,067 (87.5)		2 (0.2)	1,219 (100.0)		211	1,430
12～ (%)	91 (12.5)	634 (87.0)	3 (0.4)	1 (0.1)	729 (100.0)		136	865
14～ (%)	38 (13.1)	250 (86.5)	1 (0.3)		289 (100.0)		54	343
16～ (%)	21 (19.4)	87 (80.6)			108 (100.0)		20	128
合計 (%)	559 (12.8)	3,815 (87.0)	5 (0.1)	4 (0.1)	4,383 (100.0)		821	5,204
記載なし (%)	6 (8.6)	64 (91.4)			70 (100.0)		46	116
総計 (%)	565 (12.7)	3,879 (87.1)	5 (0.1)	4 (0.1)	4,453 (100.0)		867	5,320
平均	10.39	10.29	13.04	11.35	10.31		10.26	10.30
標準偏差	2.78	2.68	1.91	1.89	2.70		2.76	2.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査