

表 2040 HDF希釈方法 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（オフラインHDF 透析回数週3回）

透析前アルブミン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)		4 (100.0)			4 (100.0)			4
1.5～ (%)	2 (11.1)	16 (88.9)			18 (100.0)		3	21
2.0～ (%)	18 (22.2)	63 (77.8)			81 (100.0)		9	90
2.5～ (%)	39 (14.1)	238 (85.9)			277 (100.0)		57	334
3.0～ (%)	168 (13.8)	1,051 (86.1)	2 (0.2)		1,221 (100.0)		213	1,434
3.5～ (%)	300 (12.8)	2,032 (87.0)		3 (0.1)	2,335 (100.0)		473	2,808
4.0～ (%)	90 (12.3)	643 (87.6)		1 (0.1)	734 (100.0)		158	892
4.5～ (%)		24 (96.0)		1 (4.0)	25 (100.0)		7	32
5.0～ (%)		2 (100.0)			2 (100.0)		1	3
合計 (%)	617 (13.1)	4,073 (86.7)	2 (0.0)	5 (0.1)	4,697 (100.0)		921	5,618
記載なし (%)	17 (12.1)	121 (85.8)	3 (2.1)		141 (100.0)		69	210
総計 (%)	634 (13.1)	4,194 (86.7)	5 (0.1)	5 (0.1)	4,838 (100.0)		990	5,828
平均	3.52	3.57	3.40	3.86	3.56		3.60	3.57
標準偏差	0.45	0.43		0.43	0.44		0.42	0.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査