

表 2047 HDF希釈方法 総コレステロール濃度(mg/dL)別（オフラインHDF 透析回数週3回）

総コレステロール濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	23 (14.3)	138 (85.7)			161 (100.0)		31	192
100～ (%)	61 (15.1)	342 (84.7)	1 (0.2)		404 (100.0)		73	477
120～ (%)	111 (15.5)	600 (84.0)	1 (0.1)	2 (0.3)	714 (100.0)		135	849
140～ (%)	107 (13.1)	705 (86.6)	1 (0.1)	1 (0.1)	814 (100.0)		168	982
160～ (%)	85 (12.7)	583 (87.1)		1 (0.1)	669 (100.0)		128	797
180～ (%)	52 (13.1)	345 (86.9)			397 (100.0)		68	465
200～ (%)	36 (14.6)	211 (85.4)			247 (100.0)		38	285
220～ (%)	13 (13.7)	81 (85.3)		1 (1.1)	95 (100.0)		28	123
240～ (%)	5 (11.1)	39 (86.7)	1 (2.2)		45 (100.0)		3	48
260～ (%)	2 (10.5)	17 (89.5)			19 (100.0)		8	27
合計 (%)	495 (13.9)	3,061 (85.9)	4 (0.1)	5 (0.1)	3,565 (100.0)		680	4,245
記載なし (%)	139 (10.9)	1,133 (89.0)	1 (0.1)		1,273 (100.0)		310	1,583
総計 (%)	634 (13.1)	4,194 (86.7)	5 (0.1)	5 (0.1)	4,838 (100.0)		990	5,828
平均	152.38	154.85	161.50	162.00	154.52		154.86	154.58
標準偏差	36.04	35.71	59.39	42.25	35.79		37.08	35.99

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査