

表 2048 HDF希釈方法 HDL-C濃度(mg/dL)別（オフラインHDF 透析回数週3回）

HDL-C濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)		18 (100.0)			18 (100.0)		2	20
20～ (%)	33 (14.4)	193 (84.3)	3 (1.3)		229 (100.0)		49	278
30～ (%)	130 (17.1)	629 (82.8)	1 (0.1)		760 (100.0)		118	878
40～ (%)	141 (16.7)	701 (83.2)		1 (0.1)	843 (100.0)		153	996
50～ (%)	84 (14.2)	505 (85.6)	1 (0.2)		590 (100.0)		121	711
60～ (%)	61 (15.0)	344 (84.7)		1 (0.2)	406 (100.0)		71	477
70～ (%)	24 (12.9)	162 (87.1)			186 (100.0)		42	228
80～ (%)	7 (7.9)	82 (92.1)			89 (100.0)		29	118
90～ (%)	5 (10.9)	41 (89.1)			46 (100.0)		8	54
100～ (%)	5 (12.8)	34 (87.2)			39 (100.0)		5	44
合計 (%)	490 (15.3)	2,709 (84.5)	5 (0.2)	2 (0.1)	3,206 (100.0)		598	3,804
記載なし (%)	144 (8.8)	1,485 (91.0)		3 (0.2)	1,632 (100.0)		392	2,024
総計 (%)	634 (13.1)	4,194 (86.7)	5 (0.1)	5 (0.1)	4,838 (100.0)		990	5,828
平均	47.80	49.58	33.40	54.00	49.29		50.59	49.49
標準偏差	15.47	17.28	14.42	16.97	17.03		17.18	17.06

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査