

表 2050 HDF希釈方法 透析前収縮期血圧(mmHg)別（オフラインHDF 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)		1 (100.0)			1 (100.0)			1
60～ (%)	2 (9.5)	19 (90.5)			21 (100.0)		7	28
80～ (%)	17 (13.4)	110 (86.6)			127 (100.0)		28	155
100～ (%)	53 (12.0)	386 (87.7)	1 (0.2)		440 (100.0)		71	511
120～ (%)	123 (12.4)	868 (87.2)	3 (0.3)	1 (0.1)	995 (100.0)		177	1,172
140～ (%)	177 (13.8)	1,105 (85.9)	1 (0.1)	4 (0.3)	1,287 (100.0)		236	1,523
160～ (%)	120 (14.7)	694 (85.3)			814 (100.0)		179	993
180～ (%)	55 (15.4)	301 (84.6)			356 (100.0)		57	413
200～ (%)	13 (15.9)	69 (84.1)			82 (100.0)		18	100
220～ (%)	5 (17.2)	24 (82.8)			29 (100.0)		3	32
合計 (%)	565 (13.6)	3,577 (86.2)	5 (0.1)	5 (0.1)	4,152 (100.0)		776	4,928
記載なし (%)	69 (10.1)	617 (89.9)			686 (100.0)		214	900
総計 (%)	634 (13.1)	4,194 (86.7)	5 (0.1)	5 (0.1)	4,838 (100.0)		990	5,828
平均	148.95	146.68	124.00	142.40	146.96		147.04	146.97
標準偏差	27.29	26.35	12.57	11.10	26.48		26.45	26.47

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査