

表 2051 HDF希釈方法 透析前拡張期血圧(mmHg)別（オフラインHDF 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)		1 (100.0)			1 (100.0)			1
20～ (%)	3 (10.3)	26 (89.7)			29 (100.0)		8	37
40～ (%)	61 (14.0)	374 (86.0)			435 (100.0)		88	523
60～ (%)	254 (13.4)	1,640 (86.3)	3 (0.2)	3 (0.2)	1,900 (100.0)		361	2,261
80～ (%)	151 (14.9)	862 (84.9)	2 (0.2)		1,015 (100.0)		156	1,171
90～ (%)	65 (13.4)	419 (86.2)		2 (0.4)	486 (100.0)		102	588
100～ (%)	26 (10.7)	217 (89.3)			243 (100.0)		60	303
120～ (%)	5 (17.9)	23 (82.1)			28 (100.0)		2	30
140～ (%)		2 (100.0)			2 (100.0)			2
合計 (%)	565 (13.7)	3,564 (86.1)	5 (0.1)	5 (0.1)	4,139 (100.0)		777	4,916
記載なし (%)	69 (9.9)	630 (90.1)			699 (100.0)		213	912
総計 (%)	634 (13.1)	4,194 (86.7)	5 (0.1)	5 (0.1)	4,838 (100.0)		990	5,828
平均	76.12	76.51	71.20	78.20	76.45		76.08	76.39
標準偏差	15.15	15.28	9.65	15.59	15.26		15.62	15.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査