

表 2070 HDF希釈方法 治療方法(新分類)別 (オンラインHDF 透析回数週3回)

治療方法 (新分類)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)								
Off-line HDF (%)								
On-line HDF (%)	28,783 (91.7)	1,326 (4.2)		1,280 (4.1)	31,389 (100.0)	1	1,910	33,300
Push/Pull HDF (%)								
バイオフィルトレーション (%)								
血液濾過 (%)								
血液吸着透析 (リクセル) (%)								
血液吸着透析 (その他) (%)								
在宅血液透析 (%)								
腹膜透析 (CAPD) (%)								
腹膜透析 (APD) (%)								
腹膜透析 (CCPD) (%)								
合計 (%)	28,783 (91.7)	1,326 (4.2)		1,280 (4.1)	31,389 (100.0)	1	1,910	33,300
記載なし (%)								
総計 (%)	28,783 (91.7)	1,326 (4.2)		1,280 (4.1)	31,389 (100.0)	1	1,910	33,300

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査