

表 2088 HDF希釈方法 体重減少量(kg)別（オンラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満	77	1		2	80		3	83
(%)	(96.3)	(1.3)		(2.5)	(100.0)			
0.0～	911	40		40	991		78	1,069
(%)	(91.9)	(4.0)		(4.0)	(100.0)			
1.0～	5,198	252		194	5,644		377	6,021
(%)	(92.1)	(4.5)		(3.4)	(100.0)			
2.0～	10,510	500		396	11,406	1	672	12,079
(%)	(92.1)	(4.4)		(3.5)	(100.0)			
3.0～	5,890	252		205	6,347		394	6,741
(%)	(92.8)	(4.0)		(3.2)	(100.0)			
4.0～	1,619	77		50	1,746		117	1,863
(%)	(92.7)	(4.4)		(2.9)	(100.0)			
5.0～	299	17		12	328		19	347
(%)	(91.2)	(5.2)		(3.7)	(100.0)			
6.0～	39	7		2	48		1	49
(%)	(81.3)	(14.6)		(4.2)	(100.0)			
7.0～	12			1	13			13
(%)	(92.3)			(7.7)	(100.0)			
8.0～	21			2	23		2	25
(%)	(91.3)			(8.7)	(100.0)			
合計	24,576	1,146		904	26,626	1	1,663	28,290
(%)	(92.3)	(4.3)		(3.4)	(100.0)			
記載なし	486	44		97	627		39	666
(%)	(77.5)	(7.0)		(15.5)	(100.0)			
総計	25,062	1,190		1,001	27,253	1	1,702	28,956
(%)	(92.0)	(4.4)		(3.7)	(100.0)			
平均	2.59	2.58		2.58	2.59	2.20	2.55	2.58
標準偏差	1.02	0.99		1.23	1.02		1.06	1.03

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査