

表 2089 HDF希釈方法 体重減少率(%)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満	433	15		14	462		23	485
(%)	(93.7)	(3.2)		(3.0)	(100.0)			
1.0～	747	32		31	810		77	887
(%)	(92.2)	(4.0)		(3.8)	(100.0)			
2.0～	2,176	102		85	2,363		153	2,516
(%)	(92.1)	(4.3)		(3.6)	(100.0)			
3.0～	4,966	222		177	5,365		332	5,697
(%)	(92.6)	(4.1)		(3.3)	(100.0)			
4.0～	6,825	334		204	7,363	1	456	7,820
(%)	(92.7)	(4.5)		(2.8)	(100.0)			
5.0～	5,344	247		207	5,798		342	6,140
(%)	(92.2)	(4.3)		(3.6)	(100.0)			
6.0～	2,649	133		102	2,884		177	3,061
(%)	(91.9)	(4.6)		(3.5)	(100.0)			
7.0～	1,007	38		50	1,095		71	1,166
(%)	(92.0)	(3.5)		(4.6)	(100.0)			
8.0～	293	18		20	331		17	348
(%)	(88.5)	(5.4)		(6.0)	(100.0)			
9.0～	123	5		12	140		14	154
(%)	(87.9)	(3.6)		(8.6)	(100.0)			
合計	24,563	1,146		902	26,611	1	1,662	28,274
(%)	(92.3)	(4.3)		(3.4)	(100.0)			
記載なし	499	44		99	642		40	682
(%)	(77.7)	(6.9)		(15.4)	(100.0)			
総計	25,062	1,190		1,001	27,253	1	1,702	28,956
(%)	(92.0)	(4.4)		(3.7)	(100.0)			
平均	4.58	4.62		4.73	4.59	4.25	4.55	4.59
標準偏差	1.58	1.52		1.74	1.58		1.62	1.58

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査