

表 2094 HDF希釈方法 equilibrated Kt/V(eKt/V)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	12 (85.7)	1 (7.1)		1 (7.1)	14 (100.0)		1	15
0.4～ (%)	21 (91.3)	1 (4.3)		1 (4.3)	23 (100.0)		2	25
0.6～ (%)	215 (93.1)	10 (4.3)		6 (2.6)	231 (100.0)		17	248
0.8～ (%)	1,564 (91.0)	79 (4.6)		76 (4.4)	1,719 (100.0)		106	1,825
1.0～ (%)	5,456 (91.9)	241 (4.1)		237 (4.0)	5,934 (100.0)		351	6,285
1.2～ (%)	7,234 (92.1)	361 (4.6)		263 (3.3)	7,858 (100.0)		476	8,334
1.4～ (%)	5,173 (92.9)	249 (4.5)		145 (2.6)	5,567 (100.0)	1	327	5,895
1.6～ (%)	2,443 (92.3)	122 (4.6)		82 (3.1)	2,647 (100.0)		170	2,817
1.8～ (%)	952 (94.8)	38 (3.8)		14 (1.4)	1,004 (100.0)		71	1,075
2.0～ (%)	708 (95.3)	25 (3.4)		10 (1.3)	743 (100.0)		28	771
合計 (%)	23,778 (92.4)	1,127 (4.4)		835 (3.2)	25,740 (100.0)	1	1,549	27,290
記載なし (%)	1,284 (84.9)	63 (4.2)		166 (11.0)	1,513 (100.0)		153	1,666
総計 (%)	25,062 (92.0)	1,190 (4.4)		1,001 (3.7)	27,253 (100.0)	1	1,702	28,956
平均	1.35	1.35		1.29	1.35	1.56	1.34	1.35
標準偏差	0.29	0.28		0.26	0.29		0.28	0.29

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査